

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. - LAVSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. - NO ALMACENE EN CASAS HABITACION. - NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. - NO SE INGERIA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. - NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS: Si el producto ha sido ingerido, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dé a tomar agua tibia salada hasta que el vómito sea claro. Retire al paciente de la fuente de contaminación, colóquelo en lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no introduzca nada por la boca. En todos los casos lleve al paciente al hospital. Si hubo contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si existe salpicadura en los ojos, enjuague copiosamente con agua limpia, durante un tiempo mínimo de 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Grupo químico: **Cipertoato 300 CE** es una mezcla de productos del grupo químico de los Organofosforados + Piretroides.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: En caso de ingestión es indicado el lavado gástrico simple y la administración de pentobarbital para las manifestaciones nerviosas. El ingrediente activo de este producto es un fuerte inhibidor de la colinesterasa. Cuando se presenten los primeros síntomas de intoxicación, administrar Sulfato de atropina de 2 a 4 mg por vía intravenosa, hasta que los signos de atropinización aparezcan. Mantener al paciente bajo observación médica por lo menos por un periodo de 48 horas. El tratamiento es sintomático.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Este producto afecta al sistema nervioso central y periférico, produciéndose depresión respiratoria y cardíaca. Los síntomas por intoxicación con este producto es edema pulmonar, vista borrosa, dolor de cabeza, opresión torácica, náuseas, vómito, ansiedad, debilidad, cianosis y contracción de la pupila.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. - EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). - EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA. - REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES). ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.



Atención a INTOXICACIONES
01 800 000 ATOX (2869)

USO AGRÍCOLA

Sifatec®

Cipertoato

dimetoato + cipermetrina 300 CE

Insecticida / Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
Dimetoato: O,O-Dimetil S-metilcarbamoilmetil- fosforoditiato (Equivalente a 200 g de i.a./ L a 20 °C)	18.70
Cipermetrina: (+)-alfa-ciano-3-fenoxibencil-(+)- cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 107 g de i.a./ L a 20 °C)	10.00
INGREDIENTES INERTES:	71.30
Solvente, emulsificantes y compuestos relacionados.	
TOTAL:	100.00

RSC0- MEZC-1194-301-009-029

CONTENIDO NETO: 950 mL 5 L



**NO CIVO EN CASO DE INGESTIÓN.
NO CIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL.
NO CIVO SI SE INHALA**

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:



Sifatec®
¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olimo No. 32, Valle de los Pinos, Tlahuepano, Edo. de México, C.P. 54040
Tel: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx

Fecha de fabricación y N° de lote:



FECHA DE CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADAS
INSTRUCCIONES DE USO - ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

CULTIVO	NOMBRE COMÚN PLAGAS	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS mL / ha	OBSERVACIONES
Frijol (30)	Mosquita Blanca	Bemisia tabaci	300	Aplicación al follaje
Lima, Limonero, Mandarino, Naranja, Tangerino. (15)	Psílido asiático de los cítricos Escama de nieve de los cítricos	Diaphorina citri Unaspis citri	500 a 1000 750 a 1000	Realice dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días; volumen de aplicación 800 L de agua / ha.
Maiz, Sorgo. (14)	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	300-500	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 250 - 300 L de agua / ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 12 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Agite antes de usar. Abra el envase de **Cipertoato 300 CE** girando la tapa hasta romper el arillo de seguridad, con la misma tapa de forma invertida colóquela sobre el sello de seguridad presionando y girándola para romper totalmente el sello. En un recipiente limpio por separado realice una premezcla, agregue agua hasta un tercio de su capacidad. Vierta lentamente en el recipiente la cantidad necesaria de **Cipertoato 300 CE** agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla. La aplicación foliar puede ser realizada con equipo de mochila manual o de motor, montado al tractor, el cual debe ser calibrado para aplicar la dosis recomendada en el volumen de agua calculando y en la superficie correspondiente.

CONTRAINDICACIONES: No aplique **Cipertoato 300 CE** durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15 km/h), ni cuando exista una alta probabilidad de lluvia que pueda provocar el lavado del producto de la superficie foliar. Se recomienda hacer las aplicaciones durante las primeras horas de la mañana.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico en las dosis y cultivos aquí recomendados.

INCOMPATIBILIDAD: **Cipertoato 300 CE** no debe ser mezclado con otros productos.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DETOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



04SEP20

PRECAUCIÓN