

Sifatec®

Qúprophos

Fertilizante / Polvo Soluble

10-56-4

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% EN PESO
Nitrógeno asimilable (N)	10.00
Fósforo grado farmacéutico (P ² O ⁵)	56.00
Potasio (K ₂ O)	4.00
INGREDIENTES INERTES:	
Aniones relacionados, agentes quelatantes, surfactantes, diluyentes y compuestos afines	30.00
TOTAL:	100.00%

REG. RSCO-0007/I/96
CONTENIDO NETO: 1 Kg

Fecha de formulación y No. Lote:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su formulación.



DISTRIBUIDO POR:

Sifatec®

¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax.: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx



ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Al mezclar, cargar y aplicar utilice el equipo de protección (lentes protectores, guantes, overol, botas, mascarilla y gorra). No remueva la mezcla con las manos aunque se lleven puestos los guantes, para ello utilice un removedor. Evite que le bañe la aspersión. Después de aplicar, báñese y póngase ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO.

• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA. • MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de irritación en la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si ha habido contacto con los ojos, lávese con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO: Si hubiera ingestión accidental, provoque el vómito. No hay antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD. • RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. • NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA. • NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA. • RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y FORMA AQUÍ RECOMENDADA INSTRUCCIONES DE USO • SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Cuprophos es un fertilizante foliar, tiene una rápida penetración por la planta, su alto contenido de fósforo favorece y promueve la floración y la fructificación, el óptimo desarrollo de frutos y semillas, una mejor maduración de frutos y mayor vigor de las plantas. Recomendado para aumentar la masa radicular y el vigor en las primeras etapas de crecimiento.

CULTIVO	DOSIS (kg/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
Algodón	2.0 a 3.0	La primera aplicación al inicio de la formación de cuadros; la segunda al inicio de la floración y la tercera a la formación de bellotas.
Alfalfa	2.0 a 3.0	Aplicar 10 días después de cada corte, cuando la planta tenga suficiente área foliar. Asperjar muy bien las plantas pequeñas.
Cebada, Maíz, Trigo y Sorgo	2.0 a 3.0	La primera durante la etapa del desarrollo vegetativo y la segunda al inicio de la floración.
Frijol, Soya y Garbanzo	1.0 a 2.0	La primera aplicación antes de la floración; la segunda al inicio de la formación de la vaina y la tercera 15 días después.
Fresa	2.0 a 4.0	La primera aplicación antes de floración y cada tres semanas durante la producción.
Frutales	300 a 600 g/100 L de agua	La primera al inicio de la floración; la segunda al inicio de la formación del fruto y la tercera tres semanas después de la segunda.
Hortalizas en general	2.0 a 3.0	Iniciar una semana antes de la floración y repetir cada tres semanas.
Ornamentales	2.0 a 4.0	Aplicar en las etapas críticas de requerimiento de fósforo.
Papa, Camote y Remolacha	2.0 a 3.0	Iniciar cuando las plantas tengan 30 cm. de altura y repetir cada cuatro semanas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Abra cuidadosamente la bolsa. Colóquese de espaldas al viento y vierta la cantidad de **Cuprophos** necesario para la aplicación en una cubeta con agua, agite suavemente hasta obtener una mezcla uniforme utilizado para ello un removedor y nunca las manos. Agregar esta mezcla, lentamente y agitando el tanque de aplicación y/o tambor que contenga agua hasta la mitad y posteriormente llene con agua necesaria para obtener una mezcla uniforme sin grumos y aplicar de inmediato.

En aplicaciones con aspersora manual generalmente usa de 100 a 200 L de agua/ha. Con aspersoras de tractor de 200 a 400 L de agua/ha, en aspersiones aéreas de 50 a 100 L de agua/ha. En el caso de frutales, las dosis están señaladas para aplicarse en un volumen de agua de 800 a 1200 L de agua/ha.

CONTRAINDICACIONES: No aplique **Cuprophos** cuando amenace lluvia o ésta se presente, porque se lava el producto. En caso de ser mezclado con algún plaguicida es recomendable para mayores especificaciones, consultar la etiqueta del plaguicida en cuestión.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **Cuprophos** con productos de fuerte reacción alcalina. Si se desea mezclar solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.

FITOTOXICIDAD: **Cuprophos** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

