

Sifatec®

**cautivo**

**cletodime** **120 CE**

Herbicida / Concentrado Emulsionable

**RSCO-HEDE-0270-310-009-013**

**Formulación:** Concentrado Emulsionable

**Composición Porcentual**

<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	<b>% EN PESO</b>
<b>Cletodime:</b> (5RS)-2-[(E)-1-[(2E)-3-cloroaliloxiimino]propil]-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-hidrox ciclohex-2-en-1-ona (Equivalente a 120 g i.a. /L a 20°C)	<b>13.00</b>
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Estabilizante, emulsicantes y solvente.	<b>87.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>100.00</b>

**Ingrediente activo:**

**Cautivo 120 CE®** es un herbicida da base de cletodime de la familia ciclohexanodiona de acción sistémica selectiva. No afecta a hojas anchas. Su uso es en el control de malezas gramíneas anuales y perennes en post-emergencia. La mezcla del ingrediente activo y los surfactantes otorgan un rápido y prolongado control.

**Modo de acción:**

**Cautivo 120 CE®** Se absorbe rápidamente por las hojas de las gramíneas y luego transportado por vía sistémica a las yemas donde ejerce su acción herbicida. Se inactiva inmediatamente al contacto con el suelo. No presenta acción por vía radical. Los síntomas se aprecian de 1 a 3 semanas después de la aplicación dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. La maleza detiene su crecimiento a las 24 horas después de la aplicación.

**Espectro de uso:**

Su uso es en el control de malezas gramíneas anuales y perennes en post-emergencia presentes en cultivos como alfalfa, algodón, calabaza, calabacita, melón, sandía pepino, cebolla, tomate de cáscara, jitomate, papa, chile y berenjena.

**Recomendaciones de uso:**

Use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, gafas, mascarilla, guantes y botas de neopreno que sólo se destine para el manejo y aplicación de plaguicidas. No coma, beba o fume durante su manejo y aplicación, antes de hacerlo lávese perfectamente con agua corriente y jabón. No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersión con la boca. Al finalizar el

trabajo báñese y cámbiese de ropa. No deben manejar este producto personas menores de 18 años de edad o que no estén entrenadas para el manejo de plaguicidas.

#### Método de preparación:

Mézclase la dosis de **Cautivo 120 CE®** en la cantidad necesaria de agua para cubrir una hectárea. La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza. La superficie del suelo debe estar húmeda (lluvia o riego) para que el producto actúe adecuadamente, mezclar el producto con agua limpia y en cantidades suficientes para lograr buen cubrimiento. Se aplican de 150 a 250 L/ha de agua en mezcla con el producto, con los equipos convencionales de aspersión, usando una boquilla de abanico (Teejet 8002 y 8003). **Cautivo 120 CE®** se aplica en post-emergencia a la maleza y el cultivo, debe aplicarse solamente cuando las malezas tengan como máximo 15-20 cm de altura.

#### Malezas que se controlan con CAUTIVO®:

Cultivo	Nombre común / Nombre científico	Dosis (L/ha)	Observaciones
Alfalfa (15)	Zacate jhonson ( <i>Sorghum halepense</i> )  Verdolaga ( <i>Avena fatua</i> )  Escobilla ( <i>Phalaris minor</i> )	0.60– 0.80	Aplicar en post-emergencia a la maleza y al cultivo, en aplicación total. Aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo, con una altura máxima entre 15 - 20cm y/o 4 a 6 hojas como máximo.
Algodonero (60)			
Calabaza			
Calabacita			
Melón			
Sandía			
Pepino (14)			
Cebolla (45)			
Tomate de cáscara (20)			
Jitomate			
Papa	Escobilla ( <i>Phalaris minor</i> )	0.60– 0.80	Aplicar en post-emergencia a la maleza y al cultivo, en aplicación total. Aplicar cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo, con una altura máxima entre 15 - 20cm y/o 4 a 6 hojas como máximo.
Chile			
Berenjena			
(30)			
<b>( ) Intervalo de seguridad:</b> Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. <b>Tiempo de reentrada a la zona tratada:</b> 48 horas después de su aplicación.			

#### Contraindicaciones:

Por la actividad residual de **Cautivo 120 CE®** el suelo tratado debe ser incorporado a una profundidad de 10 cm antes de sembrar o plantar cualquier otro cultivo de rotación. No aplicar el producto sin el equipo de protección adecuado.

#### Compatibilidad:

No mezclar a **Cautivo 120 CE®** con agroquímicos de fuerte reacción alcalina ni con productos que pudieran contener Permanganato de Potasio. Si se desconoce la compatibilidad de algunas



# Sifatec

*¡Para quien sólo usa lo mejor!*

mezclas, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación. En caso de ser mezclado solo se podrá hacer con aquellos productos que cuenten con registro vigente ante la autoridad competente.

**Fitotoxicidad:**

**Cautivo 120 CE<sup>®</sup>** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

**Presentaciones:** 950 ml