



RSCO-HEDE-0204-362-034-090

Formulación: Gránulos Dispersables

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 900 g i.a. /kg)	90.00
INGREDIENTES INERTES: Diluyente, humectante y dispersante.	10.00
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:


COACH 90 DF® es un herbicida de la familia de las “triazinas”, de acción sistémica y residual que, generalmente, se usa como pre-emergente aplicado al suelo luego de la siembra del cultivo. La atrazina también puede usarse como post-emergente temprano sobre malezas recientemente emergidas, aunque, en ese caso, su acción fundamentalmente es de contacto.

Modo de acción:

COACH 90 DF® inhibe la transferencia de energía a través del ‘Fotosistema II’. Los herbicidas de este tipo (‘inhibidores PSII’) se adhieren a una proteína involucrada en la cadena de transferencia, reduciendo su efectividad. Este producto en aplicaciones al suelo, funciona como un “sello” puesto que el producto se activa al contacto con el agua de riego o de lluvia y absorbido por las raíces de las malezas.

Espectro de uso:

COACH 90 DF® resulta efectivo en el control de numerosas malezas de hoja ancha y zacates, entre los que destacan: quelites bledo, coralillo, bolsa de pastor, cenizo blanco o quelite cenizo, tronadora o chipilín, estramonio o toloache, zacate pata de gallo, acahual, lechosa o golondrina, anisillo, estrellita o rosilla chica, malva o malvas, llantén, chilillo, verdolaga, rabanillo o rábano silvestre, zacate cola de zorra. Puede ser aplicado en el control de las malezas más comunes en cultivos de: Caña de azúcar, Sorgo, Maíz.



Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guante, mascarilla, overol, etc). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.


Método de preparación:

Con el equipo de seguridad puesto, abra cuidadosamente la bolsa antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una pre-mezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **COACH 90 DF** a utilizar, agitando continuamente hasta homogeneizar la mezcla. Para preparar la mezcla utilice agua limpia, libre de sedimentos (lodo), Posteriormente vaciar al tanque del equipo de aplicación, agregue agua hasta la totalidad de la capacidad de tanque y aplicar de inmediato. con equipo de mochila utilice de 200 a 600 L de agua/ha. y con equipo de tractor de 400 a 600 L de agua/ha.

COACH 90 DF® es un herbicida selectivo formulado como gránulos dispersables. Es absorbido principalmente por las raíces, pero también por las hojas de las malezas. Controla a las siguientes malas hierbas de hoja ancha y zacates:

Cultivo	Aplicación	Dosis (kg/ha)	Observaciones
Maíz	Pre-emergencia: antes de la nacencia del cultivo	1.10 a 2.90	En suelos pesados o con alta infestación de maleza, se debe usar la dosis alta. Cuando el cultivo siguiente sea algodón no aplicar más de 1.3 Kg. El suelo deberá ser bien mullido y húmedo. Después de que haya brotado la maleza, pero antes de que alcance los 4 cm. de altura. Con maleza de 15 a 20 cm. de altura.
	Emergencia	0.90 a 1.0	
	Post-emergencia	1.10 a 1.25	

Maleza que controla	Nombre científico
HOJA ANGOSTA:	
Cadillo	<i>Cenchrus equinatus</i>
Muela de Caballo	<i>Brachiaria spp</i>
Zacate pinto	<i>Echinochloa colonum</i>
Zacate caricillo	<i>Panicum fasciculatum</i>
Pelo de conejo	<i>Poa annua</i>
Cola de zorra	<i>Setaria spp</i>



HOJA ANCHA:	
Quelite	<i>Amaranthus spp</i>
Quelite cenizo	<i>Chenopodium album</i>
Verdolaga	<i>Portuca oleracea</i>
Golondrina	<i>Euphorbia spp</i>
Correhuela	<i>Ipomoea spp</i>
Achual	<i>Encelia mexicana</i>
Polocoteo Girasol	<i>Helianthus annus</i>
Malva	<i>Malva spp</i>
Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>
Bolsa de pastor	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Achualillo	<i>Bidens pilosa</i>
Calabacilla	<i>Sicyos angulata.</i>
() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la ultima aplicación y la cosecha.	
SL: Sin limites	
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas después de su aplicación.	

Contraindicaciones:

En áreas cultivadas en las cuales existe una rotación con hortalizas o cultivos diferentes a los aquí recomendados no deberá utilizarse dosis mayores de 1.8 kg/ha y deberán transcurrir de 4 a 6 meses antes de sembrarse en áreas con lluvias abundantes, se podrá sembrar 6 meses después con papa, haba, trigo o algodón.

Compatibilidad:

Al mezclarse con otros productos autorizados en este cultivo, no se han presentado problemas de incompatibilidad. Ante la duda, realice una prueba previa a la aplicación

Fitotoxicidad:

COACH 90 DF no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

Presentaciones: 1k