Sifatec
¡Para quien sólo usa lo mejor!

Sifatec®

Resplandor 380 CE

ametrina + 2,4-D éster
Herbicida / Concentrado Emulsionable

RSCO-MEZC-HEDE-1206-X0018-009-41.90
Formulación: Concentrado emulsionable

Composición Porcentual

INGREDIENTE ACTIVO:	**% EN PESO**
Ametrina: N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio 1,3,5-triazina 2,4-diamina. (Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	**25.50**
Éster isobutílico del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético: Isobutilo de 2,4-diclorofenoxiacetato (con un contenido no menor de 79.77% de ácido 2,4-diclorofenoxiacético" (Equivalente a 130 g de ácido 2,4-D/ L a 20 °C).	**16.40**
INGREDIENTES INERTES:	
Solvente y emulsificantes.	**58.10**
TOTAL:	**100.00**

Ingrediente activo:

Resplandor 380 CE es un herbicida formulado con dos ingredientes activos pertenecientes al grupo Triazina y Alquilclorofenoxi, que sirve para el control de malezas de hoja ancha y angosta.

Modo de acción:

Resplandor 380 CE se utiliza en post-emergencia temprana sobre malezas de hoja ancha y hoja angosta, actuando de manera selectiva por contacto. **Resplandor 380 CE** es la combinación perfecta de dos herbicidas con diferentes modos de acción; la Ametrina es absorbida por las raíces y las hojas de las malezas, se mueve en forma acropétala por el xilema y se acumula en los puntos meristemáticos y el 2,4-D éster es un herbicida post-emergente selectivo con actividad auxínica capaz de actuar sobre los mecanismos que regulan el crecimiento vegetativo de las plantas, para el control de las malezas de hoja ancha, es de acción sistémica que se absorbe por el follaje y raíces. De acción rápida y con prolongado efecto residual.

Espectro de uso:

Resplandor 380 CE se utiliza en post-emergencia temprana sobre las malezas de hoja ancha y angosta en cultivos de caña de azúcar.

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, botas de neopreno, lentes de seguridad, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Resplandor 380 CE** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato. Debe aplicarse cuando la mayoría de las malezas de hoja ancha y zacates hayan brotado y antes de estos últimos amacollen. Para mejores resultados convienen que la altura de las hierbas de hojas ancha y zacates no sea mayor de 10 cm, y el suelo tenga humedad. Puede aplicarse con aspersora de mochilas o tractor. Estimar la dosis de plaguicida y el gasto de agua del equipo a utilizar sobre la superficie a tratar, a fin de evitar remanente de producto diluido.

Resplandor 380 CE es un herbicida selectivo que actúa por contacto y absorción sobre maleza de hoja ancha y zacates. Se aplica en post-emergencia temprana a maleza y al cultivo. Es importante que haya humedad en el suelo y que la maleza no esté en estado de marchitez. Se recomienda para el control de maleza que se indica en el siguiente cuadro:

Cultivo	**Maleza**	**Dosis (L/ha)**	**Observaciones**
Caña de azúcar (SL)	Verdolaga (*Portulaca oleracea*) Amargosa (Parthenium hysterophorus) Gigantón (*Tithonia tubaeiformis*) Zacate pinto (*Eragrostis diffusa*) Quelite (*Amaranthus hybridus*) Zacate liendrilla (*Leptochloa filiformis*) Meloncillo (*Cucumis dipsaceus*)	4.0-6.0	Realizar una aplicación en post-emergencia temprana a la maleza y al cultivo; volumen de aplicación 350-450 L de agua/Ha.
() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** Sin Límite. **Tiempo de reentrada a la zona tratada:** 24 horas después de su aplicación.			

Contraindicaciones:

No aplique **Resplandor 380 CE** cuando el viento sea muy fuerte (más de 15 km/h), para evitar la deriva, ni a temperaturas muy altas (más de 35°C).

Compatibilidad:

No se debe mezclar **Resplandor 380 CE** con otros productos.

Fitotoxicidad:

Resplandor 380 CE no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

Presentaciones:

900mL y 5L.