

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones de uso. Use el equipo de protección personal adecuado en el manejo, preparación y aplicación del producto (botas y guantes de neopreno, overol de algodón, lentes de seguridad o careta protectora y mascarilla con respirador). Antes de volver a utilizar el equipo de protección personal y/o ropa de trabajo, estos deberán ser lavados con agua limpia y jabón, de manera separada a la ropa de uso común; secar al sol y guardar en el área de trabajo, el producto sobrante deberá ser almacenado en este mismo contenedor, almacenar este producto bajo llave en el lugar de trabajo. El equipo de trabajo debe mantenerse limpio y almacenarse en el área de trabajo. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua limpia y jabón.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. - NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. - MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. - LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. - NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONES. - NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. - LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. - AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA. - NO SE INGERIA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. - NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. - NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRE ESTA ETIQUETA PRIMEROS AUXILIOS

Solicite atención médica mientras logra lo siguiente:

INHALACIÓN: Si es inhalado, retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado. Si es necesario, dar respiración artificial por el personal capacitado con las debidas precauciones: no dar respiración de boca a boca cuando la persona haya tragado el producto o tenga contaminada la cara, utilice un dispositivo ambu (resucitador manual o bolsa autoinflable). **CONTACTO CON LOS OJOS:** En caso de contacto con los ojos, enjuéguelos con abundante agua limpia por lo menos durante 15 minutos. **CONTACTO CON LA PIEL:** En caso de contacto con la piel, quítese la ropa contaminada, lave el área afectada con abundante agua y jabón para retirar el producto. Dar atención médica en caso de que la irritación persista. Quitar la ropa contaminada y los zapatos. Lavar la ropa contaminada y los zapatos antes de volver a utilizarlos. **SI FUE INGERIDO:** No provoque el vómito, si está inconsciente no administre nada por la boca y busque inmediata atención médica.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **Fenoxon 650 CE** es un insecticida botánico a base de Extracto de neem (*azadiractina*) y Extracto de canela (*cinamaldehído*).

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: **Fenoxon 650 CE** es un producto de muy baja toxicidad, sin embargo, se pueden presentar los siguientes signos y síntomas en caso de intoxicación severa. **POR VÍA INHALATORIA:** irritación de vías respiratorias, insuficiencia respiratoria. **POR VÍA DERMAL:** irritación dermal. **POR VÍA ORAL:** vómito, diarrea, dolor e irritación gastrointestinal.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico. En caso de intoxicación aguda inmediatamente al médico y dar tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. - MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. - EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). - EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO. - REALICE EL TRIPLÉ LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.



Atención a INTOXICACIONES
01 800 000 ATOX (2869)

USO AGRÍCOLA

Sifatec®

Fenoxon

extracto de neem y extracto de canela 650 CE

Insecticida / Concentrado Emulsionable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTES ACTIVOS:	% EN PESO
Extracto de neem: <i>Azadirachta indica</i> (Equivalente a 514.25 g de i.a. / L a 20°C)	55.00
Extracto de canela: <i>Cinnamomum zeylanicum</i> (Equivalente a 140.25 g de i.a. / L a 20°C)	15.00
INGREDIENTES INERTES: Tensoactivos y disolvente.	30.00
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-MEZC-INAC-0104R-0104S-X0056-009-70.00


CONT. NETO: 950 mL 10L

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN

PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

PUEDE SER NOCIVO SI SE INHALA

Fecha de fabricación y Nº de lote:



FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su fabricación



DISTRIBUIDO POR:

Sifatec®
¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo Nº 32, Valle de los Pinos, Tlalpauhtla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-4658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADAS INSTRUCCIONES DE USO - SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

Fenoxon 650 CE es un insecticida botánico de uso agrícola, formulado como concentrado emulsionable, recomendado para el control de las plagas en los cultivos indicados a continuación:

CULTIVO	PLAGA / NOMBRE CIENTÍFICO / NOMBRE COMÚN	DOSES (L/ha)	OBSERVACIONES
Calabacita, Calabaza, Sandía, Melón, Pepino, Chayote (SL)	Trips <i>Thrips tabaci</i>	1.5-2.0	Realizar 3 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones al detectar los primeros adultos y ninfas de la plaga; volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha
Jitomate, Chile, Berenjena, Papa, Tomate verde, Pimiento morrón (SL)	Ninfas y adultos de Mosquita blanca <i>Bemisia tabaci</i>	1.5-2.0	Realizar 3 aplicaciones a intervalo de 7 días, iniciar las aplicaciones al detectar los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación 550-650 L/ha.
Aguacate (SL)	Araña roja (<i>Oligonychus punicea</i>) Araña cristalina (<i>Oligonychus perseae</i>)	1.5 - 2.5	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detectan los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación 1,000 L/ha.
Zarzamora, Ajonjolí, Groseta, Frambuesa, Fresa, Vid, Kiwi (SL)	Araña roja (<i>Tetranychus urticae</i>) Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>) Mosca de vinagre de alas manchadas (<i>Drosophila suzukii</i>)	1.5 - 2.5	Realizar 2 aplicaciones al follaje a intervalo de 7 días, cuando se detectan los primeros individuos de la plaga; volumen de aplicación 400 L/ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha

SL: Sin Límite

Tiempo de reentrada a la zona tratada: Inmediatamente después de que seque el rocío de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

Siempre use el equipo de protección descrito en la sección "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta. Realice la mezcla del producto en un lugar ventilado. Con el equipo de seguridad puesto, para abrir el envase, quite la tapa rosca, retire el sello de seguridad y utilice. Llene el tanque a la mitad de su capacidad con agua limpia. En forma separada prepare una pre-mezcla con poca agua y mida la dosis a emplear de **Fenoxon 650 CE** con una probeta graduada. Una vez que el líquido se diluya por completo, vierta esta pre-mezcla al tanque y complete con agua sin dejar de agitar y aplicar de manera inmediata.

CONTRAINDICACIONES: No deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o está lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

FITOTOXICIDAD: **Fenoxon 650 CE** no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No debe mezclarse **Fenoxon 650 CE** con otros productos agroquímicos.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



16FEB21

PRECAUCIÓN