

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección personal adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, pantalón largo, camisa de manga larga, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. Después de una jornada de trabajo; Lave los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Lave la ropa y equipo de protección con agua caliente y detergente separado de otra ropa, deseche las ropas y otros materiales absorbentes que se hayan empapado o contaminado seriamente con el concentrado de este producto. Después de la jornada laboral almacene el equipo de protección en el lugar de trabajo. No las vuelva usar. Todos los usuarios deberán: Lavarse las manos antes de comer, fumar, beber, mascar chicle, tabaco o usar el baño. Lavarse perfectamente y ponerse ropa limpia.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

-NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. -NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. -MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. -LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. -NO ALMACENE EN CASAS HABITACION. -NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. -LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. -AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. -NO SE INGIERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. -NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. -NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA PRIMEROS AUXILIOS: Si es inhalado, retire a la persona del área de exposición al aire fresco. Si la persona respira con dificultad proporcione respiración artificial. Reciba atención médica. **En caso de contacto con la piel,** retire la ropa contaminada y lave el área afectada con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos, si persiste la irritación reciba atención médica. **Si el producto es ingerido,** si la persona esta en condiciones de tragar dar a beber un vaso de agua. No inducir el vómito a menos que lo indique el médico. No introducir nada por la boca si la persona está inconsciente. **En caso de contacto con los ojos,** mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lentamente con agua de 15 a 20 minutos. Quite los lentes de contacto si están presentes, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando. Si persiste la irritación reciba atención médica.

RECOMENDACIONES AL MEDICO

Grupo químico: **Fundazol 250 EW** pertenece al grupo químico de los Triazolés.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico por lo que se recomienda dar tratamiento sintomático y de sostén.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: El contacto con los ojos puede causar irritación de los ojos con lagrimeo, dolor o visión borrosa. El contacto repetido o prolongado con la piel puede causar irritación, ardor, enrojecimiento, inflamación, o sarpullido. En caso de inhalación puede causar náuseas, mareos, vómitos, debilitamiento muscular, dificultades respiratorias, taquicardia, sudor excesivo y en caso de una sobreexposición sangrado de nariz, temblores y convulsiones. Si se ingiere puede causar náuseas y vómito.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

-DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. -MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. -EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). -EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO. -REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES **EXTRAMADAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (INVERTEBRADOS ACUÁTICOS). ESTE PRODUCTO ES **ALTAMENTE TÓXICO** PARA ANIMALES (PECES) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.



Atención a INTOXICACIONES
01 800 000 ATOX (2869)

USO AGRÍCOLA

Sifatec®



Fundazol

tebuconazole

250 EW

Fungicida / Emulsión Aceite en Agua

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Tebuconazol: (RS)-1-p-dorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-ol (Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	25.87
INGREDIENTES INERTES:	74.13
Microbiostático, espesante, humectante, dispersante, antiespumante y disolvente.	
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-FUNG-0349-X0056-345-25.87

CONTENIDO NETO: 950 ml



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA**



DISTRIBUIDO POR:
Sifatec®
¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx

**HECHO EN
MÉXICO
Y/O INDIA**



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADAS INSTRUCCIONES DE USO - ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Fundazol 250 EW es un fungicida formulado como una emulsión de aceite en agua, diseñado para el control de las plagas que se indican a continuación:

CULTIVO	ENFERMEDAD NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/ha)	OBSERVACIONES
Avena, Cebada, Sorgo, Trigo (35)	Roya (<i>Puccinia striiformis</i> f. sp. tritici)	0.5 - 0.6	Se recomienda realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días, con un volumen de aplicación de 550 a 650 L de agua/ha.
Vid (14)	Cenicilla (<i>Uncinula necator</i>)	0.5 - 1.0	Se recomienda realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, con un volumen de aplicación de 830 a 930 L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 12 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Evite el contacto con la mezcla tanto al momento de la preparación como de la aplicación. Para aplicaciones terrestres puede utilizar distintos equipos dependiendo de las condiciones físicas de la parcela y estado de desarrollo del cultivo. Se recomienda utilizar una aspersora motorizada, acondicionada con aguilón de abanico, previamente calibrada. Se recomienda iniciar las aplicaciones cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad. En el cultivo de vid se recomienda aplicar la dosis alta con alta presión de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales como la humedad y temperatura, favorezcan el rápido desarrollo de la enfermedad.

CONTRAINDICACIONES: No aplique en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta.

FITOTOXICIDAD: Fundazol 250 EW no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezcle **Fundazol 250 EW** con ningún otro producto. Sin embargo si se desea mezclar, se recomienda en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad previa a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL USO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



29MART19

PRECAUCIÓN