

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Sifatec®

Gibgro Tablets

ácido giberélico

20

Regulador de Crecimiento no Sintético / Tabletas

COMPOSICIÓN GARANTIZADA	% PESO
INGREDIENTE ACTIVO Ácido Giberélico A3	20
INGREDIENTES INERTES: Sucrosa (Azúcar)	80
TOTAL:	100

REG. RSCO-0376/III/99 FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADA CONTENIDO NETO: 10 TABLETAS DE 5 g



DISTRIBUIDO POR:

Sifatec®
¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalneantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx

HECHO
EN
E. U. A.

Fecha de formulación y N° de lote:

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su formulación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Al mezclar, cargar y aplicar utilice el equipo de protección adecuado (lentes protectores, guantes, overol botas, mascarilla y gorra). No remueva la mezcla con las manos aunque se lleven puestos los guantes, para ello utilice un removedor. Evite que le bañe la aspersión. Después de aplicar, báñese y póngase ropa limpia.

•NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. •NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA. •MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. •LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. •NO SE INGERIA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL.

EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO

PRIMEROS AUXILIOS: Si el producto ha sido ingerido, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta o dé a tomar agua tibia salada hasta que el vómito sea claro. Retire al paciente de la fuente de contaminación, colóquelo en un lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado. Si la persona esta inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no introduzca nada por la boca. En todos los casos lleve la paciente al hospital. Si hubo contacto con la piel lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si existe salpicadura en los ojos, enjuagar copiosamente con agua limpia durante un tiempo mínimo de 15 minutos.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD.
- RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.
- NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.
- NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA.
- RESPETE LAS DOSIS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO.

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transporte, manejo, aplicación y dosificación están fuera de control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE DE LA FORMA AQUÍ RECOMENDADA INSTRUCCIONES DE USO

Gibgro Tablets 20 es un regulador de crecimiento que mejora las condiciones de diferentes cultivos, cuya acción depende de varios factores, por lo que para obtener mejores resultados, se sugiere hacer pruebas antes de la aplicación a gran escala.

CULTIVO	DOSIS (EN TABLETAS), MÉTODOS DE APLICACIÓN Y EFECTO
Alfalfa	Aplique 5, 15 días antes del corte. Aumenta la producción.
Apio	Aplique 7 cuando el cultivo tenga 15 cm de altura. Aumenta la producción y tamaño de la planta.
Berenjena	Aplique 5, cuando inicie la floración. Aumenta la producción.
Caña de azúcar	Aplique 10, cuando el cultivo este pequeño. Motiva el crecimiento de la planta.
Chile	Aplique 10, a la semana de plantar y 5 adicionales en la floración. Ayuda al enraizamiento, al crecimiento de la planta y aumenta la producción.
Chícharo	Aplique 2, cuando inicie la floración. Motiva el crecimiento de la planta y aumenta la producción.
Cítricos	Aplique 2, cuando termina la floración y el fruto esta pequeño. Aumenta la producción.
Clavel	Aplique 8, cuando la planta tenga 15 cm. de altura y 8 adicionales a los 2 meses. Aumente la producción Alarga los tallos y la flor es más grande.
Col	Aplique 3, 15 días después del trasplante y 3 adicionales a los 45 días. Aumenta la producción y tamaño de la planta.
Crisantemo	Aplique 10, en el desarrollo inicial de la planta y 10 adicionales en el abotonamiento 40 días antes de la floración. Alarga los tallos y la flor es más grande.
Fresa	Aplique 10 en viveros, 6 adicionales en la floración y 6 más en la segunda floración. Aumenta el número de estolones y la producción.
Frijol	Aplique 2, cuando inicie la floración. Aumenta la producción.
Jitomate	Aplique 4, dos semanas después del trasplante, 4 adicionales cuando la planta tenga los primeros brotes florales y 4 al iniciarse la formación de frutos. Motiva el crecimiento de la planta y aumenta la producción.
Melón, Pepino y Sandía	Aplique 6, al iniciar la floración, 10 adicionales directamente al fruto, 20 días antes de la cosecha. Aumenta la producción.
Papa	Aplique ¼ de pastilla a tubérculos cortados sumergidos por 10 minutos y 1 a tubérculos enteros sumergidos por 10 minutos. Aumenta la producción.
Vid	Uva sin semilla: Aplique 3 antes de la floración, 2 durante la floración y 6 a la caída de los pétalos. Uva con semilla: Aplique 2 cuando el racimo tenga 4 cm de longitud. Aumenta la producción y la ventilación del racimo.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente la caja. En un recipiente con agua, prepare la solución, mezclando la cantidad de tabletas correspondientes para cada cultivo.

INCOMPATIBILIDAD: **Gibgro Tablets 20** no debe mezclarse con productos de fuerte reacción alcalina.

09JUL18



Atención a INTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

