

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. • MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. • LAVÉSE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO ALMACENE EN CASAS HABITACION. • NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. • LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. • AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA. • NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. • NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. • NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto, recuéstela en un lugar ventilado y abríguela bien. Consiga atención médica de inmediato. Si no puede respirar retire secreciones, cuerpos extraños en vías aéreas, proporcione respiración de boca a boca con un trapo de por medio y tráselo rápidamente al servicio médico más próximo. Si penetró en los ojos, mantenga los párpados bien abiertos y lávese por lo menos durante 15 minutos con agua corriente. Si hubo derramamiento sobre la piel, lávese ésta cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes). Si ha ingerido el producto y no está consciente, darle inmediatamente grandes cantidades de agua no inducir el vómito. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **Monocrotofos 600 LS** es del grupo de los Organofosforados.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: La atropina es el antidoto específico contra la estimulación nerviosa parasimpática. Cuando haya síntomas de estimulación parasimpática deberá inyectar sulfato de atropina por intervalos de 10 minutos en dosis de 1 a 2 mg hasta que haya atropinización completa. La morfina, epinefrina o noradrenalina están contraindicadas. El 2-PAM también es un antidoto y puede usarse conjuntamente con la atropina, mientras se mantiene al paciente atropinizado. En caso de adultos, aplicar una dosis inicial de 1 mg, de 2-PAM inyectada preferiblemente como infusión de 250 ml, de solución salina durante un periodo de 15 a 20 minutos. Si esta no puede efectuarse, el 2-PAM debe administrarse lentamente por inyección endovenosa en forma de solución acuosa al 5% durante un periodo de 2 minutos. Después de una hora puede estar indicado aplicar otra inyección de 1 g, de 2-PAM si la debilidad muscular no ha cedido. Para niños, la dosis de 2-PAM es de 0.25 g, manténgase limpio el sistema respiratorio superior teniendo al paciente boca abajo con la cabeza de lado. Puede ser necesario administrar oxígeno. Téngase al paciente en observación.

SÍGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Debilidad, dolor de cabeza, rigidez del tórax, vusca nublada, gran contracción de la pupila sin reacción a la luz, salivación, vértigo, sudoración, náuseas, diarrea y contracciones abdominales.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. • ANTES DE USAR EL PRODUCTO, VERIFIQUE QUE EL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. • EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). • EN CASO DE CADA ACIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL, HASTA DONDE SEA POSIBLE Y LO DEMÁS RECÓGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO. • REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE SE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES DE SANGRE FRÍA (PECES, ANFIBIOS Y PLANTAS ACUÁTICAS) Y ALGAS VERDES ACUÁTICAS. ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportation, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

USO AGRÍCOLA

Sifatec®

Monocrotofos



monocrotofos

600 LS

Insecticida y/o Acaricida / Líquido Soluble

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Monocrotofos: Dimetil[E]-1-metil-2 (metilcarbamoil) vinil fosfato (Ecuivalente a 600 g de i.a./l. a 20°C)	56.00
INGREDIENTES INERTES:	44.00
Solventes	
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-INAC-0149-328-052-056

CONTENIDO NETO: 950 mL



**MORTAL EN CASO DE INGESTIÓN
MORTAL POR EL CONTACTO CON LA PIEL**



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Sifatec

¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalneantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx



ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADAS INSTRUCCIONES DE USO - ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Monocrotofos 600 LS es un concentrado líquido soluble, que actúa de manera sistémica y de contacto, que cuando se diluye con agua forma una solución estable.

CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSES L/ha	CULTIVO	PLAGA NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSES L/ha
Algodonero (21)	Araña roja (<i>Tetranychus spp</i>) Chinche agostosa café (<i>Euchistus severus</i>) Chinche ligus (<i>Lygus spp</i>) Chinche manchado (<i>Dydercus spp</i>) Chinche rápida (<i>Traumatodes spp</i>) Chinche verde (<i>Mizana viridula</i>) Gusano bellotero (<i>Heliothis zea</i>) (<i>Heliothis virescens</i>) Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>)	0.5 - 1.5	Tabaco (5)	Gusano de la yema del tabaco (<i>Heliothis virescens</i>) Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Mosquita blanca (<i>Trialeurodes spp</i>) Picudo (<i>Tripharsa chempensis</i>) Pulgua saltona del tabaco (<i>Epiria hirtipennis</i>)	1.0-1.5
	Gusano rosado (<i>Pectinophora gossypiella</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Medidor de la hoja de algodónero (<i>Aphis gossypii</i>) Mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) Picudo del algodónero (<i>Anthonomus grandis</i>) Pulgua saltona del algodónero (<i>Pseudotomoseus senatus</i>) Pulgua de algodón y melón (<i>Aphis gossypii</i>)	0.5 - 1.5	Caña de azúcar (30)	Barrenador del tallo (<i>Chilo spp</i>) Barrenador grande del maíz (<i>Diatraea grandiosella</i>) Barrenador occidental (<i>Diatraea aspidaria</i>) Chinche de encaje de la caña de azúcar (<i>Leptodictya tabida</i>) Mosca pinta (<i>Aedesmia pictica</i>) Mosca pinta o salvazo (<i>Prosopea simulans</i>) Pulgón amarillo de la caña de azúcar (<i>Sipha flava</i>)	1.0-1.5
	Pulgón de la papa (<i>Macrosiphum solanifolii</i>) Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Mosquita blanca de los invernalederos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Palomilla de la papa (<i>Phthorimaea operculella</i>) Pulgua saltona negra (<i>Epiria spp</i>) Pulgón (<i>Macrosiphum spp</i>)		1.0-1.5	Cacahuete (21)	Diabrotica o doradilla (<i>Diabrotica spp</i>) Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)
	Soya (30)	Catarina o mayate (<i>Diabrotica balteata</i>) Franeado del pino chinche ligus (<i>Lygus spp</i>) Chinche verde (<i>Mizana viridula</i>) Falso medidor de la soya (<i>Pseudotopispa includens</i>) Gusano peludo (<i>Estigmene acrea</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>) Gusano terciopelo (<i>Anticarsia gemmatilis</i>) Trips negro (<i>Caliothrips phaseoli</i>) Gusano de la vaina (<i>Heliothis zea</i>)	5.0-1.0	Jitomate, Tomate de cáscara (21)	Chicharrita (<i>Empoasca spp</i>) Gusano de cuerno del jitomate (<i>Manduca quinqueaculeata</i>) Gusano del fruto (<i>Heliothis zea</i>) Gusano falso medidor de la col (<i>Trichoplusia ni</i>) Mosquita blanca de los invernalederos (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) Pulgua saltona negra (<i>Epiria spp</i>) Pulgón mizus (<i>Myzus persicae</i>) Trips de las flores (<i>Frankliniella tritici</i>) Gusano soldado (<i>Spodoptera exigua</i>)

() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 72 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Monocrotofos 600 LS** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla y aplicar de inmediato.

CONTRAINDICACIONES: No aplique **Monocrotofos 600 LS** en horas de calor intenso, ni cuando el viento sea fuerte (15 km/h). Se recomienda aplicar en las primeras horas de la mañana. No pastorear ganado en áreas tratadas. No tocar las áreas tratadas durante los dos días después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: **Monocrotofos 600 LS** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: **Monocrotofos 600 LS** no debe ser mezclado con productos de reacción alcalina.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNANDO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Atención a INTOXICACIONES
01 800 000 ATOX (2869)

PELIGRO



30 JUL 20