

USO AGRÍCOLA

Sifatec®

NovaBacter

500

estreptomycin + oxitetracycline + copper chloride

Bactericida / Polvo Humectable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

	% EN PESO
INGREDIENTE ACTIVO:	
Estreptomycin: Sulfato de estreptomycin (Equivalente a 17.6 g de i.a./kg)	2.205
Oxitetracycline: Clorohidrato de oxitetracycline "Con un contenido de oxitetracycline base no menor del 75%" (Equivalente a 1.75 g de i.a./kg)	0.189
Oxícloruro de Cobre: Oxícloruro de cobre, con un contenido de cobre metálico como elemento no menor del 59%. (Equivalente a 424 g de i.a./kg).	78.489
INGREDIENTES INERTES: Diluyentes y humectantes.	19.117
	TOTAL: 100.00


REG. RSCO-MEZC-1306-302-002-081

CONT. NETO: 1kg



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL
NOCIVO SI SE INHALA

FECHA DE CADUCIDAD: 2 años después de su formulación.
Fecha de formulación y N° de lote:



FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:

Sifatec®

¡Para quien sólo usa lo mejor!

Olmo N° 32 Valle de los Pinos, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx



PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. • MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO ALMACENE EN CASAS HABITACION. • NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. • LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. • AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BAÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. • NO SE INGIERA, INHALE Y EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. • NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. • NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA

PRIMEROS AUXILIOS: retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto y recuéstela en un lugar bien ventilado. Consiga atención médica inmediatamente. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si hubo alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos durante 15 minutos con agua corriente y abundante. Si hubo derramamiento sobre la piel, lávese cuidadosamente con agua y jabón y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada (póngase guantes). Si ha sido ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada por la boca.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo quimico: **NOVABACTER 500** es una mezcla de dos antibióticos no estériles (estreptomicina y oxitetraciclina) bactericidas sistémicos, más oxiclورو de cobre (fungicida cúprico).

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: en caso de intoxicación, se recomienda realizar un lavado cuidadoso del estómago con carbón medicinal (3 a 5 cucharadas con medio litro de agua), óxido de magnesio y sulfato de sodio (2 cucharadas en medio litro de agua), prohibir la ingestión de alcohol, grasas o aceite y dar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN: los síntomas de intoxicación derivados por el contacto o exposición constante y prolongada hacia el producto son sensación de quemadura en la boca y el esófago, diarrea, vómito, anuria, lesión hepática, colapso y convulsiones.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. • EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE PEZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). • EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE COPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN EL CULTIVO Y ENFERMEDAD AQUÍ RECOMENDADAS INSTRUCCIONES DE USO • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

NOVABACTER 500 es un bactericida-fungicida con propiedades sistémicas y de contacto, utilizado para el control de la siguiente enfermedad:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
PERAL (30)	TIZÓN DE FUEGO (<i>Erwinia amylovora</i>)	600 g / 100 L de agua

(): intervalo de seguridad en días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: en cuanto seque el rocío de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: abra cuidadosamente la bolsa. Colóquese de espaldas al viento y vierta la cantidad de **NOVABACTER 500** necesario para la aplicación en una cubeta con agua, agite suavemente hasta obtener una mezcla uniforme utilizado para ello un removedor y nunca las manos. Agregar esta mezcla, lentamente y agitándola el tanque de aplicación y/o tambor que contenga agua hasta la mitad y posteriormente llene con agua necesaria para obtener una mezcla uniforme sin grumos y aplicar de inmediato. En cada ocasión que cargue la aspersora deberá agitar la mezcla del tambor. **NOVABACTER 500** puede ser aplicada con cualquier equipo aspersor siempre y cuando facilite la cobertura uniforme de las superficies tratadas.

CONTRAINDICACIONES: **NOVABACTER 500** contiene antibióticos no estériles, por lo que deberá evitar su uso en medicina veterinaria, humana o cualquier otro uso diferente al agrícola.

FITOTOXICIDAD: **NOVABACTER 500** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: **NOVABACTER 500** no debe ser mezclado con productos de fuerte reacción alcalina como caldo bordelés. La mezcla con otros productos deberá hacerse con aquellos que se encuentren registrados y autorizados ante la autoridad competente.

MANEJO DE RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Atención a intoxicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

