

Sifatec®

# Portento

piriproxifeno 100 CE

Insecticida / Concentrado Emulsionable

RSCO-INAC-1104P-X0033-009-10.99

**Formulación:** Concentrado emulsionable

**Composición porcentual:**

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<b>Piriproxifeno:</b> 4-fenoxifenil(RS)-2-(2-piridoxi)propil éter. (Equivalente a 100 g de i.a./L a 20°C)	<b>10.99</b>
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>	
Surfactante, solvente y antioxidante	<b>89.01</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>100.00</b>

**Ingrediente activo:**

**Portento 100 CE** es un insecticida formulado con el ingrediente activo Piriproxifeno, derivado de la piridina.

**Modo de acción:**

**Portento 100 CE** es un insecticida hormonal de triple acción: larvicida-ovicida-esterilizante, que actúa por contacto e ingestión y que presenta una elevada persistencia, que permite mantener el control sin repetir el tratamiento en la mayor parte de los casos.

**Espectro de uso:**

Efectivo para el control de mosca blanca y trips en cultivos como berenjena, chile, jitomate, papa y tomate de cáscara.

**Recomendaciones de uso:**

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, goggles, mascarilla, overol, botas, gorra o sombrero de platico, etc.). Durante la preparación y aplicación del producto hágala a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación. Al terminar las labores descontamine el equipo de aplicación y coloque en un lugar ventilado, la ropa utilizada durante la aplicación debe lavarse con agua y jabón. El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

**Método de preparación:**

Antes de abrir el envase, agítelo para uniformizar el contenido. Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos, así como su inhalación tanto al momento de la preparación como de aplicación. Calibre el equipo de aplicación para determinar el gasto de agua por hectárea a utilizar. Llene el tanque de aspersión con agua hasta la mitad. Agregue al tanque la cantidad requerida de **Portento 100 CE** bajo agitación empleando una jarra medidora graduada. Llene finalmente el tanque con agua hasta su capacidad total agitándolo, con agitación continua.

Para aplicaciones terrestres puede utilizarse distintos equipos dependiendo de las condiciones físicas de la parcela y estado de desarrollo del cultivo. Pueden usarse mochilas manuales o motorizadas, así como aguilonos adaptados a un tractor, todos previamente calibrados. Se recomienda utilizar un gasto de agua de 300L/ha, asegurando una buena cobertura del follaje de las plantas.

Se recomienda su uso para el control de las plagas que se indican en los siguientes cultivos:

Cultivo	Plaga	Dosis (ml/ha)	Observaciones
Berenjena, Chile, Jitomate, Papa, Tomate de cáscara (14)	Ninfas de mosquita blanca ( <i>Bemisia argentifolii</i> ) Trips ( <i>Frankiniella occidentalis</i> )	300-500	Realizar tres aspersiones foliares a intervalos de siete días.
<b>( ) Intervalo de seguridad:</b> Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. <b>Tiempo de reentrada a la zona tratada:</b> 12 horas después de su aplicación			

**Contraindicaciones:**

No aplique **Portento 100 CE** en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta para evitar deriva y desperdicio de producto.

**Compatibilidad:**

No mezclar **Portento 100 CE** con otros productos.

**Fitotoxicidad:**

**Portento 100 CE** no es fitotóxico a los cultivos aquí recomendados si se utiliza de acuerdo a las indicaciones de esta etiqueta.

**Presentaciones:** 240 mL y 950 mL.