



Mytanil Plus

azufre elemental + myclobutanil 695 FW

Fungicidas / Floable

REG. RSCO-MEZC-1374-301-342-050

Formulación: Floable

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Azufre elemental: azufre elemental (equivalente a 675 g de i.a./L)	48.36
Myclobutanil: alfa-butil-alfa-(4-clorofenil)-1H 1,2,4-triazol-1-propano nitrilo (equivalente a 28 g de i.a./L)	2.00
INGREDIENTES INERTES: Diluyentes, dispersantes, humectantes, surfactante, conservador, vehículo	49.64
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Mytanil Plus 695 FW es un fungicida del grupo de azufre y triazoles (myclobutanil).

Modo de acción:

Es de acción sistémica y de contacto. Actúa impidiendo la biosíntesis de los ergosteroles de los hongos o sustancias presentes en las membranas de las células en donde regulan los intercambios entre el medio ambiente y el interior, presentada en forma floable.

Espectro de uso:

Para el control de un amplio espectro de enfermedades en diversos cultivos como: jitomate, tomate de cáscara, chile, vid, pepino, calabaza, calabacita, melón y sandía.

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (ropa protectora, lentes, mascarilla, overol, gorra, botas y guantes). La ropa contaminada deberá lavarse por separado en agua caliente antes de volver a usarla. Bañarse bien con agua y jabón después de

manejar este producto. El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:

Agite bien el producto antes de usarse, mezcle las dosis de producto recomendado al tanque de aplicación de la aspersora, utilice los volúmenes de agua convencionales que son de 500 hasta 2000 L. En las aplicaciones con altos volúmenes se recomienda aplicar también las dosis altas del producto. Verifique que su equipo de aplicación cuente con un buen sistema de agitación ya que esto es muy importante para tener una mezcla uniforme.

Para utilizarse en los siguientes cultivos:

CULTIVO	ENFERMEDAD NOMBRE COMUN/NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/Ha)
Jitomate (1)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	1.5 – 2.0 ¹ 2.0 – 2.5 ²
Chile (1)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	1.5 – 2.0 ¹ 2.0 - 2.5 ²
Pepino, Calabaza, Calabacita, Melón, Sandía (1)	Cenicilla (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	1.5 – 2.0 ¹ 2.0 - 2.5 ²
Tomate de cáscara (1)	Cenicilla (<i>Leveillula taurica</i>)	1.5 – 2.0 ¹ 2.0 – 2.5 ²
Vid (14)	Cenicilla (<i>Uncinula necator</i>)	2.5 – 3.0 ³

OBSERVACIONES: ¹ Realice la aplicación de manera preventiva cuando las condiciones climáticas sean favorables para el desarrollo de la enfermedad, con un intervalo no mayor de 12 días entre aplicaciones. ² Aplique esta dosis cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad con una incidencia no mayor a un 0.4% del área afectada. ³ Realice las aplicaciones de manera preventiva desde las primeras etapas de brotación del cultivo y durante su pleno desarrollo, con un intervalo no mayor de 14 días entre aplicaciones.

(I) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin límite

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas después de su aplicación

Contraindicaciones:

Mytanil Plus 695 FW no debe ser aplicado cuando amenace la lluvia o esté lloviendo, ya que puede haber lavado del producto.



Compatibilidad:

Mytanil Plus 695 FW puede ser mezclado con otros plaguicidas registrados en los cultivos indicados, no obstante, se recomienda hacer una prueba previa con los plaguicidas que se pretenden mezclar.

Fitotoxicidad:

Mytanil Plus 695 FW no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados.

Presentación: 950 mL