

USO AGRÍCOLA

Sifatec®

Accord

cymoxanil

10% PH

Fungicida / Polvo Humectable

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Cymoxanil: 1-[(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilurea (equivalente a 100 g de i.a./Kg)	10.00
INGREDIENTES INERTES:	90.00
Dispersante, humectante, portador y vehículo	
TOTAL:	100.00

REG. RSCO-FUNG-0301J-X0059-002-010 **CONT.NETO: 1 kg.**



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN
NOCIVO SI SE INHALA**

Fecha de formulación y N° de lote:

**FECHA DE CADUCIDAD: 2 años
después de su formulación.**



DISTRIBUIDO POR:

Sifatec®

¡Para quien sólo usa lo mejor!

SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.
Olmo N° 32, Valle de los Pinos, Tlalneapantla, Edo. de México, C.P. 54040
Tel.: (55) 5397-5008 Fax.: (55) 5397-6658
e-mail: sifatec@sifatec.com.mx • www.sifatec.com.mx

**HECHO EN INDIA
Y/O MÉXICO**



PRECAUCIÓN

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (mascarilla, lentes de seguridad, overol, guantes y botas de neopreno). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

• NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. • NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. • MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. • LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. • NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. • NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. • LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. • AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGÁSE ROPA LIMPIA. • NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. • NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUAPOS, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. • NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

PRIMEROS AUXILIOS: Si el producto ha sido inhalado, retire al paciente de la fuente de contaminación, colóquelo en un lugar fresco, bajo sombra y bien ventilado. Si la persona está inconsciente, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad. Si el producto ha sido ingerido de a beber agua e induzca el vómito, si la persona se encuentra inconsciente no provoque el vómito y no introduzca nada por la boca. En todos los casos lleve al paciente al hospital. En caso de contacto con la piel: quite la ropa impregnada y lave las partes del cuerpo expuestas al producto con jabón y abundante agua. En caso de contacto con los ojos: de ser el caso remueva los lentes de contacto inmediatamente y lave los ojos y párpados con abundante agua por un lapso de 10 a 15 minutos.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

Grupo químico: **Accord 10% PH** pertenece al grupo Cianoacetamida oxima.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No tiene antídoto específico, el tratamiento deberá ser sintomático.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Puede causar irritación en la piel y ojos. En caso de ingestión puede causar náuseas, vómito y debilidad. En caso de inhalación puede causar mareos, dificultades respiratorias, taquicardias, sudor excesivo y en caso de una sobreexposición sangrado de nariz, temblores y convulsiones.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

• DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS. • MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT. • EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS). • EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCA.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA

ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

GARANTÍA: SÍNTESIS Y FORMULACIONES DE ALTA TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V., solamente responde por el contenido neto y la formulación correcta de este producto. El almacenamiento, transportación, manejo, aplicación y dosificación están fuera de nuestro control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADAS

INSTRUCCIONES DE USO • ¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

Accord 10% PH es un fungicida sistémico y de contacto diseñado para el control de las siguientes enfermedades en los cultivos que se indican a continuación:

CULTIVO	ENFERMEDAD NOMBRE COMÚN / NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS kg/ha	OBSERVACIONES
Calabacita, Calabaza, Melón, Pepino, Sandía (5)	Mildiu de las cucurbitáceas (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	2.0 – 3.0	Se recomienda realizar dos aplicaciones dirigidas al follaje, a intervalo de 6 días; con un volumen de aplicación de 370 – 470 L agua/ha.
Jitomate, Tomate de cáscara, Papa, Chile (14)	Tizón tardío (<i>Phytophthora infestans</i>)	2.0 – 3.0	Se recomienda realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días; con un volumen de aplicación de 275 – 375 L de agua/ha.

() **Intervalo de seguridad:** Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO: Durante el manejo, preparación y aplicación de **Accord 10% PH** siempre utilice el equipo de protección personal recomendado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta. Para abrir, corte el sobre o saco con precaución y pese la cantidad de producto necesario en una balanza que sólo sea utilizada para este fin. Llenar el tanque de aplicación hasta la mitad de su capacidad, en un recipiente a parte diluir la dosis recomendada en poca agua, vaciar al tanque de aplicación manteniendo agitación constante y agregar el resto de agua hasta llenar el tanque de aplicación.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar **Accord 10% PH** en horas de calor intenso, cuando la velocidad del viento sea alta, ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo. Preferentemente realizar la aplicación por la mañana.

FITOTOXICIDAD: **Accord 10% PH** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclar **Accord 10% PH** con ningún otro producto. Si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos agroquímicos registrados para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y de fitotoxicidad previas a la aplicación.

MANEJO DE RESISTENCIA: PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO. ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.



Atención a INTOXicaciones
01 800 000 ATOX (2869)

