

Sifatec®

**Cúprophos**

Fertilizante / Polvo Soluble

10-56-4

RSCO-0007/I/96

**Formulación:** Polvo Soluble

**Composición porcentual:**

INGREDIENTES ACTIVOS	(%EN PESO)
Nitrógeno asimilable (N)	10.00
Fósforo grado farmacéutico (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	56.00
Potasio (K <sub>2</sub> O)	04.00
Aniones relacionados, agentes quelatantes, surfactantes, diluyentes y compuestos afines.	30.00
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

**Ingrediente activo:**


Formulado a base de nitrógeno, fósforo y potasio en polvo soluble. Fertilizante foliar de amplio espectro de uso.


**Modo de acción:**

**CÚPROPPOS® 10-56-4** es un fertilizante foliar, tiene una rápida penetración y absorción por la planta, su alto contenido de fosforo favorece y promueve la floración y la fructificación, el óptimo desarrollo de frutos y semillas, una mejor maduración de frutos y mayor vigor de las plantas. Recomendado para aumentar la masa radicular y el vigor en las primeras etapas de crecimiento.

**Espectro de uso:**

Amplio espectro de uso como: frutales, gramíneas, hortalizas, oleaginosas y leguminosas.





## Recomendaciones de uso:

Al mezclar, cargar y aplicar utilice el equipo de protección adecuado (lentes protectores, guantes, overol, botas, mascarilla y gorra). No remueva la mezcla con las manos, aunque se lleven puestos los guantes, para ello utilice un removedor. Evite que le bañe la aspersion. Después de aplicar báñese y póngase ropa limpia.

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO SE INGIERA Y EVITE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”.


## Método de preparación:


Abra cuidadosamente la bolsa. Colóquese de espalda al viento y vierta la cantidad de **CÚPROPHOS® 10-56-4** necesario para la aplicación en una cubeta con agua, agite suavemente hasta obtener una mezcla uniforme utilizado para ello un removedor y nunca las manos. Agregar esta mezcla, lentamente y agitándola el tanque de aplicación y/o tambo que contenga agua hasta la mitad y posteriormente llene con agua necesaria para obtener una mezcla uniforme sin grumos y aplicar de inmediato.

Para aplicarse en los cultivos:

CULTIVO	DOSIS (kg/ha)	ÉPOCA DE APLICACIÓN
ALGODÓN	2.0 a 3.0	La primera aplicación al inicio de la formación de cuadros; la segunda al inicio de la floración y la tercera a la formación de bellotas.
ALFALFA	2.0 a 3.0	Aplicar 10 días después de cada corte, cuando la planta tenga suficiente área foliar. Asperjar muy bien las plantas pequeñas.
CEBADA, MAÍZ, TRIGO Y SORGO	2.0 a 3.0	La primera durante la etapa del desarrollo vegetativo y la segunda al inicio de la floración.
FRIJOL, SOYA Y GARBANZO	1.0 a 2.0	La primera aplicación antes de la floración; la segunda al inicio de la formación de la vaina y la tercera 15 días después.
FRESA	2.0 a 4.0	La primera aplicación antes de floración y cada tres semanas durante la producción.
FRUTALES	300 a 600 g/100 L de agua	La primera al inicio de la floración; la segunda al inicio de la formación del fruto y la tercera tres semanas después de la segunda.
HORTALIZAS EN GENERAL	2.0 a 3.0	Iniciar una semana antes de la floración y repetir cada tres semanas.
ORNAMENTALES	2.0 a 4.0	Aplicar en las etapas críticas de requerimiento de fósforo.
PAPA, CAMOTE Y REMOLACHA	2.0 a 3.0	Iniciar cuando las plantas tengan 30 cm. de altura y repetir cada cuatro semanas.

En aspersiones terrestres se usan de 200 a 400 L de agua/ha, en aspersiones aéreas de 50 a 100 L de agua/ha. En el caso de frutales, las dosis están señaladas para aplicarse en un volumen de agua de 800 a 1200 L de agua /ha.





#### **CONTRAINDICACIONES:**

No aplique **CÚPROPHOS® 10-56-4** cuando amenace lluvia o ésta se presente, porque se lava el producto. En caso de ser mezclado con algún plaguicida es recomendable para mayores especificaciones, consultar la etiqueta del plaguicida en cuestión.

#### **FITOTOXICIDAD:**

**CÚPROPHOS® 10-56-4** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

**INCOMPATIBILIDAD:** no mezclar **CÚPROPHOS® 10-56-4** con productos de fuerte reacción alcalina. Si se desea mezclar solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados.

#### **Presentación:**

1 kg

