

Mardiuron

diuron

80% WDG



Herbicida / Gránulos Dispersables en Agua

RSCO-HEDE-0221-X0050-420-080

Formulación: Gránulos dispersables en agua

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Diuron: 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea. (Equivalente a 800 g de i.a./kg)	80.00
INGREDIENTES INERTES:	
Surfactante, humectante, estabilizador, excipiente, desintegrante, impurezas y compuestos relacionados.	20.00
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Formulado a base de diuron en gránulos dispersables en agua. Herbicida acción sistémica del grupo de la urea sustituida.

Modo de acción:

MARDIURON® 80% WDG se utiliza en aplicaciones pre y post-emergentes para el control de malezas de hoja ancha y angosta, con acción sistémica, **MARDIURON® 80% WDG** penetra a las plantas principalmente a través de las raíces y de allí es conducido hacia el resto de la planta. El producto interfiere los procesos de fotosíntesis, interrumpiendo la reacción de Hill y esto conduce al colapso de hojas y brotes jóvenes. El producto también puede ser absorbido hasta cierto punto a través del follaje, en esta parte la acción se ve incrementada por la adición de surfactantes.

Espectro de uso:

De amplio espectro en aplicaciones pre y post-emergentes para el control de malezas de hoja ancha y angosta en cultivos como: maíz, cítricos, plátano, sorgo, papa, vid y caña de azúcar.

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y la aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (ropa protectora, lentes, mascarilla, overol, gorra, bota y guantes de neopreno). El producto sobrante debe conservarse en su envase original, manteniéndolo cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:

Abra cuidadosamente la bolsa y en un recipiente con agua vierta el producto necesario para la aplicación y agítelo hasta obtener una mezcla uniforme. Llene el tanque de aplicación con agua hasta la mitad, incorpore la mezcla y complete con agua hasta la capacidad total del tanque de aplicación y aplique de inmediato. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

MARDIURON® 80% WDG es recomendado en los cultivos y contra las malezas aquí indicados:

Cultivo	Malezas	Dosis (kg/ha)	Observaciones
Toronja, Limón, Lima, Mandarina, Naranja, Pomelo, (SL)	Quelite (<i>Amaranthus hybridus</i>) Ojo de pájaro (<i>Polygonum aviculare</i>) Cinco hojas (<i>Ipomoea quiquefolia</i>) Malvillas (<i>Sida rhombifolia</i>) Zacate bahía (<i>Paspalum notatum</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>)	1.5-3.0	Realizar una aplicación en pre-emergencia a la maleza y post-emergente al cultivo; volumen de aplicación 350-450 L de agua/ha.
Plátano (SL)	Calabacilla (<i>Cucurbita digitata</i>)	1.5-4.0	Aplicación en post-emergencia a la maleza.
Caña de azúcar (SL)	Calabacilla (<i>Cucurbita digitata</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>)	2.0-3.0	Aplicación en pre-emergencia a la maleza.
	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>)	2.0-2.5	
Papa (SL)	Calabacilla (<i>Cucurbita digitata</i>)	1.5-4.0	Aplicación en pre-emergencia a la maleza.
Piña (SL)	Calabacilla (<i>Cucurbita digitata</i>)	5.0	Aplicación en pre-emergencia a la maleza.
Sorgo (SL)	Calabacilla (<i>Cucurbita digitata</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>)	1.0-2.0	Aplicación en pre-emergencia a la maleza.
Vid (SL)	Calabacilla (<i>Cucurbita digitata</i>) Mostaza negra (<i>Brassica nigra</i>) Quesitos (<i>Malva parviflora</i>) Quintonil (<i>Amaranthus hybridus</i>) Tomatillo falso (<i>Lepidium sordidum</i>) Bolsa de pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>)	1.5-4.0	Aplicación en post-emergencia a la maleza.
Algodonero (SL)	Campanilla (<i>Ipomoea sp.</i>) Torito (<i>Tribulus terrestris</i>) Chayotillo (<i>Sicyos angulatus</i>)	0.8-1.25	Aplicación en pre-emergencia a la maleza y una adicional en pos-

	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Tomatillo (<i>Physalis sp.</i>) Malva común (<i>Malva parviora</i>) Girasol (<i>Helianthus annuus</i>) Rosilla (<i>Bidens sp.</i>) Zacate Johnson (<i>Sorghum halepense</i>) Trébol dulce (<i>Melilotus indica</i>) Quelite cenizo (<i>Chenopodium sp.</i>) Calabacilla (<i>Cucurbita digitata</i>) Zacate liendrilla (<i>Leptochloa-liformis</i>) Zacate rayado (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Nabo silvestre (<i>Brassica campestris</i>) Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>) Zacate de agua (<i>Echinochloa colonum</i>) Cola de zorra (<i>Setaria geniculata</i>) Quesitos (<i>Anoda cristata</i>) Lechocilla (<i>Euphorbia sp.</i>) Luzaga (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Zacate gramma (<i>Cynodon dactylon</i>) Mozote (<i>Cenchrus echinatus</i>)		emergencia dirigida a la maleza.
--	---	--	----------------------------------

(I) Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 12 horas después de su aplicación.

Contraindicaciones:

MARDIURON® 80% WDG deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicar si se sospecha de la presencia de lluvia en las horas inmediatas a la aplicación.

Compatibilidad:

MARDIURON® 80% WDG no deberá mezclarse con ningún otro plaguicida para su aplicación.

Fitotoxicidad:

Este producto no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Presentaciones:

1 kg.