

Sifatec®

MataQú

metamidofofos **600 LM**

Insecticida / Líquido Miscible

RSCO-INAC-0144-019-012-050

Formulación: Líquido miscible

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Metamidofofos: (RS)-(O,S-dimetil fosforoamidotioato. (Equivalente a 600 g de i.a./L a 20°C).	50.00
INGREDIENTES INERTES:	
Solvente, coadyuvantes y compuestos relacionados	50.00
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Formulado a base de Metamidofofos, perteneciente al grupo de los organofosforados, el cual contiene 600g de ingrediente activo por litro de producto.

Modo de acción:

MATACU® 600 LM es de acción sistémica y de contacto. **MATACU® 600 LM** es un producto formulado con alta carga de tensoactivos y solventes de baja. Una vez ingresado el insecticida al cuerpo del insecto, provoca una parálisis del SNC (periodo de residencia), el insecto queda parálítico y al no poder alimentarse, éste muere por inanición. De buena acción residual y absorción por vía radical y foliar, presentado en forma de líquido miscible para aplicar en pulverización foliar.

Espectro de uso:

Efectivo contra chinches, chicharritas, mosquitas blancas, pulgones, algunos trips, gusanos, algunos minadores de hojas y coleópteros (diabroticas y pulgas saltonas) en diversos cultivos como: Algodón, berenjena, chile, lechuga, melón, pepino, papa, soya, tomate, jitomate y tabaco.

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y la aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (ropa protectora, lentes, mascarilla, overol, gorra, botas y guantes). El producto sobrante debe conservarse en su envase original, manteniéndolo cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **MATACU® 600 LM** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla, en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla y aplicar de inmediato. En aplicación terrestre utilice al menos 200 L de agua/ha y para aplicación aérea de 40 a 60 L de agua/ha. Se recomienda iniciar las aplicaciones cuando aparezcan las plagas y repetir si es necesario, usualmente dentro de los próximos 7 a 10 días.

MATACU® 600 LM es recomendado para el control de las plagas en los cultivos aquí indicados:

CULTIVO	Nombre común	Nombre científico	DOSIS (L/Ha)
Papa (14)	Catarinita de la papa Falso medidor de la col Gusano soldado Gusano trozador Mosquita blanca de los invernaderos Palomilla de la papa Pulgón myzus Pulgón de la papa Pulguita de la papa Gusano del fruto	<i>Leptinotarsa undecemlineata</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Agrotis ipsilon</i> ; <i>Agrotis malefida</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Phthorimaea operculella</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Macrosiphum solanifolli</i> <i>Epitrix cucumeris</i> <i>Helicoverpa zea</i>	1.0-1.5
Melón (7) Pepino (7)	Gusano falso medidor de la col Minador de la hoja Pulgón del algodón y del melón Mosquita blanca de los invernaderos	<i>Trichoplusia ni</i> <i>Liriomyza spp</i> <i>Aphis gossypii</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i>	1.0-1.5
Jitomate (Tomate) (7)	Chicharrita del betabel Chinche brincadora Chinche del jitomate Diabrotica Gusano del cuerno	<i>Eutettix tenellus</i> <i>Halticus spp</i> <i>Cyrtopeltis notatus</i> <i>Diabrotica spp</i> <i>Manduca quinquemaculata</i>	0.75-1.0



Sifatec

¡Para quien sólo usa lo mejor!

	Gusano del fruto Pulgón mizus Araña roja Falso medidor de la col Gusano soldado Minador serpentina del chile Trips de las flores	<i>Helicoverpa zea</i> <i>Myzus persicae</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Liriomyza munda</i> <i>Frankliniell atritici</i>	1.0 1.0-1.5
Algodonero (50)	Chinche lygus Chinches Pulga saltona Mosquita blanca Trips Araña roja Chinche Gusano trozador Gusano soldado Gusano peludo Pulgón del algodón y del melón	<i>Lygus lineolaris</i> <i>Nezara viridula</i> y <i>Dysdercus spp</i> <i>Spanagonicus albofasciatus</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Thrips tabaci</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Chlorochroa ligata</i> <i>Agrotis spp</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Estigmene acrea</i> <i>Aphis gossypii</i>	0.75-1.0 1.0 1.0-1.5 1.0-2.0
Berenjena (14)	Pulgón myzus Gusano del fruto Gusano soldado Gusano trozador Araña roja Mosquita blanca Minador de la hoja	<i>Myzus persicae</i> <i>Heliothis zea</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Euxoa sp</i> <i>Tetranychus spp</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Liriomyza munda</i>	1.0-1.5
Chile (14)	Gusano trozador Gusano soldado Gusano falso medidor de la col Gusano del fruto Gusano del cuerno Minador de la hoja Pulga negra Pulgón myzus Mosquita blanca Pulga saltona Chinche pequeña Chicharitas	<i>Euxoa spp</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Heliothis zea</i> <i>Manduca spp</i> <i>Liriomyza munda</i> <i>Halticus spp</i> <i>Myzu persicae</i> <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Epitrix spp;Chaetocnema spp</i> <i>Cicyphus minimus</i> <i>Empoasca abrupta</i>	1.0-1.5
Tabaco (SL)	Gusano del cuerno del tabaco Gusano de la yema del tabaco Gusano falso medidor de la col Gusano peludo Mosquita blanca Pulga saltona negra	<i>Manduca sexta</i> <i>Heliothis virescens</i> <i>Trichoplusia ni</i> <i>Estigmene acrea</i> <i>Bemisia tabaci</i> <i>Epitrix spp.</i>	1.0-1.5
Lechuga (21)	Gusano falso medidor de la col Gusano soldado Pulgón myzus	<i>Trichoplusia ni</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Myzus persicae</i>	1.0
Soya (14)	Chinche apestosa café Conchuela del frijol Chinche verde Chinche lygus Diabrotica Gusano del fruto	<i>Euschistus servus</i> <i>Epilachna varivestis</i> <i>Nezara viridula</i> <i>Lygus spp.</i> <i>Diabrotica balteata</i> <i>Helicoverpa zea</i>	1.0

	Falso medidor de la soya Gusano peludo Gusano soldado Gusano terciopelo Trips negro	<i>Pseudoplusia includens</i> <i>Estigmene acrea</i> <i>Spodoptera exigua</i> <i>Anticarsia gemmatilis</i> <i>Caliothrips phaseoli</i>	
Ornamentales (SL)	Mosquita blanca de los invernaderos	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	125 mL /100 L

(I) Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Límite.

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 48 horas después de su aplicación.

Contraindicaciones:

Se recomienda hacer las aplicaciones de **MATACU® 600 LM** en las primeras horas de la mañana. No se aplique en las horas de calor intenso, ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 km/h).

Compatibilidad:

No mezclar **MATACU® 600 LM** con productos de fuerte reacción alcalina. Es compatible con insecticidas clorados y fosforados. De cualquier modo, siempre es conveniente hacer una prueba. Las mezclas con otros productos serían con aquellos que tengan registro vigente y que estén autorizados para los cultivos aquí indicados.

Fitotoxicidad:

MATACU® 600 LM no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

Presentaciones:

950 ml, 5 L y 10 L