



**RSCO-MEZC-1249-303-008-051**

**Formulación:** Suspensión acuosa

**Composición porcentual:**

<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	<b>% EN PESO</b>
<b>Ametrina:</b> N2-etil-N4-isopropil-6-metiltio-1,3,5-triazina-2,4-diamina. Equivalente a 150 g de i.a./L a 20°C.	<b>13.63</b>
<b>2,4-D:</b> Sal dimetilamina del ácido 2,4-diclorofenoxiacético (con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 83%). Equivalente a 80 g de i.a./L a 20°C.	<b>8.76</b>
<b>Diurón:</b> 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea. Equivalente a 320 g de i.a./L a 20°C.	<b>29.09</b>
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Diluyentes y compuestos relacionados	<b>10.00</b>
<b>TOTAL:</b>	<b>100.00</b>

**Ingrediente activo:**

**PAISANO® 550 FW** es un herbicida a base de ametrina, 2, 4 D y diuron pertenecientes al grupo triazina, alquiclorofenoxi y urea sustituida respectivamente, de acción sistémica para el control post-emergente.

**Modo de acción:**

**PAISANO® 550 FW** es un herbicida de rápida acción. Posee un amplio espectro de malezas, formulación estable que favorece la acción del producto en la planta.

**Espectro de uso:**

**PAISANO® 550 FW** herbicida post-emergente selectivo que controla un amplio espectro de malezas de hoja ancha y gramíneas incluso malezas de difícil control en el cultivo de caña de azúcar.

**Recomendaciones de uso:**

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, botas de neopreno, mascarilla con respirador, overol industrial y lentes de seguridad). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

**Método de preparación:**

Durante el uso y el manejo de **PAISANO® 550 FW** siempre utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto, gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. Agregue agua limpia (libre de sedimentos) hasta la mitad de la capacidad del tanque de la mezcla. El agua a utilizar en la aplicación debe tener un pH entre 5.5 – 7.0, en caso contrario adicionar un buferizante. Realice una pre-mezcla en un recipiente por separado, agregue agua y la dosis recomendada de **PAISANO® 550 FW**, agitar y vaciar la solución en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla, para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado (probeta o vaso medidor). Solo preparar la cantidad de mezcla a utilizar. Preparar la pre-mezcla en un lugar ventilado. Es imprescindible para la aplicación del producto un equipo terrestre adecuadamente calibrado, que permita aplicar un volumen de 200-300 L de agua por hectárea con una presión de aplicación menor de 30 PSI (obtener gota gruesa), además se recomienda el uso de boquillas del tipo Twin Jet o XRTee Jet.

La aplicación deberá de realizarse de manera dirigida a la maleza cuando está tenga una altura menor de 15 cm.

Efectué un triple lavado del envase vacío, y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Después de usar su equipo de aplicación, lávelo con agua y jabón. Deje circular el agua por todo el equipo, a fin de eliminar al máximo los residuos. No destapar las boquillas con la boca.

**Malezas que se controlan con PAISANO® 550 FW:**

Cultivo	Nombre común/Nombre científico	Dosis /ha
Caña de azúcar (SL)	Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> ) Gordolobo ( <i>Gnaphalium oxyphyllum</i> ) Zacate de agua ( <i>Paspalum dilatatum</i> ) Zacate pata de gallina ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Amargosa ( <i>Parthenium hysterophorus</i> )	4 - 6
	Celedonia ( <i>Euphorbia hirta</i> )	6

Maíz elotero Maíz dulce Maíz de grano (45)	Zacate peludo ( <i>Rottboellia cochinchinensis</i> ) Zacate carricillo ( <i>Leptochloa virgata</i> )  Hierba ceniza ( <i>Lagascea mollis</i> ) Hierba del alacrán ( <i>Acalypha ostryifolia</i> ) Bejuco ( <i>Ipomea nil</i> )	2.0 – 2.5*   1.5 – 2.5*
<p>*Realizar una aplicación a la maleza en post emergencia temprana; volumen de aplicación 350-450 L/ha.</p> <p><b>() Intervalo de seguridad</b></p> <p><b>TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA:</b> 12 horas después de su aplicación.</p>		

**Contraindicaciones:**

No aplicar **PAISANO® 550 FW**, en horas de calor intenso, ni cuando haya viento con velocidad mayores a los 5 km/hr. No aplicar en presencia de lluvia. No aplicar cuando se encuentren cultivos susceptibles a menos de 2 km del lugar de aplicación.

**Compatibilidad:**

**PAISANO® 550 FW** no es compatible con productos de naturaleza alcalina. Cuando se desee realizar una mezcla deberá hacerse una prueba previa para verificar la compatibilidad. Si se realizan mezclas solo deberán hacerse con productos registrados y autorizados en los cultivos aquí indicados.

**Fitotoxicidad:**

**PAISANO® 550 FW** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

**Presentaciones:**

950 ml.