



RSCO-064/V/09

Formulación: Polvo soluble

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Nitrógeno total	1.550
Fósforo disponible	7.500
Potasio	24.800
Azufre	6.910
Magnesio	3.620
Manganeso	0.170
Boro	0.080
Zinc	0.060
Cobre	0.020
Molibdeno	0.010
Agente quelatante, antiapelmazante, agua de hidratación y elementos relacionados.	55.28
Total	100.00

Modo de acción:


Formulado a base de fosforo, potasio y azufre en polvo soluble. Fertilizante foliar para uso en una amplia gama de cultivos.

Espectro de uso:

PLANT FEED P-K-S® puede ser útil para varios propósitos tomando en consideración que es una práctica que permite la incorporación inmediata de los elementos esenciales en los metabolitos que se están generando en el proceso de fotosíntesis, así como también corregir las deficiencias nutrimentales que en un momento dado se presentan en el desarrollo de la planta, que no se logran cubrir con la fertilización normal.

Recomendaciones de uso:

El uso de este producto requiere equipo de protección personal, evite inhalar partículas de polvo de la formulación usando mascarilla, evite el contacto con los ojos usando lentes de seguridad, evite el contacto con la piel usando guantes y overol.



Método de preparación:


Con el equipo de protección puesto, abra cuidadosamente el envase. En una cubeta con agua disuelva **PLANT FEED P-K-S®** en la cantidad de producto necesario para la aplicación. Agregue esta mezcla lentamente sin dejar de agitar al tanque de aplicación y/o tambo de 200 L que contenga agua necesaria para obtener una mezcla uniforme y aplique.

PLANT FEED P-K-S® es recomendado para aplicación foliar de acuerdo con las siguientes dosis.

Cultivo	Dosis (kg/ha)	Época de aplicación
Aguacate	4-6	Aplicar foliar cada 30 días posterior al cuajado del fruto.
Cebolla y ajo	2-4	Aplicar foliar cada 10 días a partir del inicio de la formación del bulbo.
Chile	1-2	Aplicar foliar cada 30 días posterior al cuajado del fruto.
Durazno	2-4	Aplicar foliar cada 15 días posterior al cuajado del fruto.
Fresa	1.5 a 2.0	Aplicar foliar cada 10 días posterior al cuajado del fruto.
Jitomate	0.5 kg por cada 100 L de agua	Aplicar foliar cada 30 días al inicio de la primera floración.
Limón	2-4	Aplicar foliar cada 15 días posterior al cuajado del fruto.
Mango	3-4	Aplicar foliar cada 15 días posterior al cuajado del fruto.
Melón, pepino, sandía, calabaza y chayote	2-4	Aplicar foliar cada 10 días posterior al cuajado del fruto.
Papaya	2-4	Aplicar foliar cada 10 días posterior al cuajado del fruto.
Piña	3-4	Aplicar foliar cada 15 días posterior al cuajado del fruto.
Plátano	3-4	Aplicar foliar cada 30 días posterior al cuajado del fruto.
Tomate de cáscara	1-2	Aplicación foliar cada 21 días.

Compatibilidad:

Si se desconoce la compatibilidad de algunas mezclas, deberá hacer una prueba previa a su aplicación. En caso de ser mezclados solo se podrá hacer con aquellos productos que cuenten con registro vigente ante la autoridad competente.





Fitotoxicidad:

PLANT FEED P-K-S[®] no es fitotóxico a las dosis aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

Presentaciones:

1 kg