



REG: RSCO-HEDE-0267-0732-375-9.72

Formulación: Concentrado soluble

Composición porcentual

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Imzetapir: Acido 5-etil-2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il]nicotínico (Equivalente a 100 g de i.a/L a 20°C)	9.72
INGREDIENTES INERTES: Agente neutralizante, humectante y diluyente	90.28
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:


Formulado a base de Imzetapir, pertenece al grupo químico de la Imidazolinonas y contiene 100 g de ingrediente activo por litro de producto.

Modo de acción:

RIDER® 100 SL posee un amplio espectro de control sobre malezas de hoja ancha y algunos zacates. Es de aplicación post emergente al cultivo, de acción sistémica. Las malezas lo absorben por las raíces y por las hojas. Se mueve por el xilema y por el floema, acumulándose en las zonas meristémicas. Actúa inhibiendo la síntesis de aminoácidos ramificados y ADN.

Espectro de uso:

RIDER® 100 SL puede ser utilizado para el control de malezas de hoja ancha y algunos zacates, en cultivos como: Alfalfa, cacahuate, frijol y soya.



Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:

Abra el envase de **RIDER® 100 SL** utilizando ropa de protección adecuada. Agregue la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque, adicione la dosis completa del producto, agite y continúe la agitación mientras se agrega el resto del agua calculada en la calibración. Es importante continuar la agitación constante para mantener una solución uniforme. Calibre su equipo de aplicación. Utilice el volumen de agua necesario para lograr una buena cobertura del área a tratar.

RIDER® 100 SL es recomendado en el cultivo y las malezas, aquí indicadas:


Cultivo	Nombre común/Nombre científico	Dosis L/ha	Observaciones
Alfalfa (30)	Aceitilla(<i>Bidens pilosa</i>)	0.8	Realizar una aplicación dirigida en post-emergencia a la maleza
	Campanilla(<i>Ipomoea purpurea</i>)		
	Diente de León(<i>Taraxacum officinale</i>)		
	Cola de Ardilla / Hierba Amargosa (<i>Parthenium hysterophorus</i>)	1.2	
Zacate Sedoso o Triguillo (<i>Setaria sp.</i>)			
() Intervalo de seguridad: Días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin limite Tiempo de reentrada a la zona tratada: 48 horas			

Contraindicaciones:

RIDER® 100 SL deberá aplicarse en condiciones climáticas favorables. No se aplique en horas de calor intenso, o de máxima insolación. No aplicarse si se sospecha de la presencia de lluvia en horas inmediatas a la aplicación.

Compatibilidad:

RIDER® 100 SL es incompatible con productos oxidantes.





Sifatec

¡Para quien sólo usa lo mejor!

Fitotoxicidad:

RIDER® 100 SL no es fitotóxico al cultivo aquí indicado si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Presentaciones:

950 mL