

Sifatec®

Vs - Mic

metalaxil **5% G**

Fungicida / Granulado

REG. RSCO-FUNG-0324-326-005-005

Formulación: Granulado

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Metalaxil: metil N-(metoxiacetil)-N-(2,6-xilil)-DL-alaninato (Equivalente a 50 g de i.a./kg a 20°C)	5.0
INGREDIENTES INERTES: Portador, fijador y antiapelmazante	95.0
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Formulado a base de Metalaxil, del grupo químico de las fenilamidas, el cual contiene 50 g de ingrediente activo por kilogramo de producto.

Modo de acción:


VS-MIC® 5% G penetra en las células del hongo e interfiere selectivamente en la síntesis del ADN, inhibiendo el crecimiento del micelio y la formación de esporas y haustorios. Puede utilizarse solo o en mezcla con fungicidas de distintos modos de acción, aumentando así el ámbito de cultivos y el espectro de acción fúngica.


Espectro de uso:

Efectivo en el control de enfermedades inducidas por Oomycetes en cultivos como: aguacate, berenjena, chile, cucurbitáceas, cítricos, jitomate, lechuga, ornamentales, papa y tomate de cáscara.

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y manteniéndolo perfectamente cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.





Método de preparación:

Abra cuidadosamente la bolsa de **VS-MIC® 5% G** es un fungicida listo para aplicación directa como granulo al suelo e incorporado en este medio de forma manual o mecánica, complementado su incorporación por lluvia o riego. Se puede esparcir con la mano (usando guantes) o con ayuda de un esparcidor manual o motorizado o de tractor, en la zona cercana de las raíces del cultivo.

VS-MIC® 5% G está recomendado para el control de las siguientes enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro siguiente:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS kg/Ha	OBSERVACIONES
Chile, Berenjena (7)	Damping-off o ahogamiento (<i>Phytophthora capsici</i>)	25	Una aplicación en banda o moteado a las plántulas al momento del trasplante. Aplíquese al momento de la siembra a fin de proteger las plántulas desde pequeñas.

Contraindicaciones

No aplicar **VS-MIC® 5% G** más de 4 veces por temporada y alternar con fungicidas de contacto

Compatibilidad:

VS-MIC® 5% G no debe de aplicarse con ningún otro producto.

Fitotoxicidad:

VS-MIC® 5% G no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de la etiqueta.

Presentación:

5kg y 20 kg.

