



Majestad

S-metolaclor + atrazina

664 SC

REG. RSCO-MEZC-HEDE-1240-X0046-064-60.4

Formulación: Suspensión concentrada

Composición porcentual

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
S-metolaclor: (aRS,1S)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) acet-o-toluidida y 20-0% de (aRS,1R)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil) acet-o-toluidida. (Equivalente a 290 g de i.a. /L a 20°C).	26.40
Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina. (Equivalente a 374 g i.a. /L a 20°C).	34.00
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, emulsificante, emulsionante, anticongelante, espesante, antiespumante, conservador y disolvente.	39.60
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Majestad 664 SC es un herbicida formulado a base de S-metolaclor y Atrazina, de los grupos de las cloracetamidas y triazinas, respectivamente. Es sistémico, selectivo. Se aplica en preemergencia y post-emergencia temprana a la maleza (menos de 2 cm).

Modo de acción:

Actúa inhibiendo la transferencia de energía a través del fotosistema II, bloqueando así la fotosíntesis, acción causada por la atrazina. El ingrediente activo S- metolaclor inhibe la germinación y el crecimiento de las células. La absorción del S-metolaclor es a través de los brotes todavía subterráneos del tallo y las raíces antes de que las plantas emerjan; y la de la atrazina se realiza tanto por vía radicular como foliar.

Espectro de uso:

Tiene control sobre malezas de hoja ancha y hoja angosta. Permitido en los cultivos de maíz, sorgo y agave.



Recomendaciones de uso:

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos.

Método de preparación:

Para abrir el envase, quite la tapa de rosca y retire el sello de seguridad, evitando el contacto con la ropa, piel y ojos. Llene el tanque con agua a una tercera parte a la mitad de su capacidad total. Mida con una probeta o algún utensilio de medición la cantidad necesaria de **Majestad 664 SC** de acuerdo a las dosis indicadas en esta etiqueta, adicione el resto de agua y agite hasta que quede homogénea. Es importante mantener la agitación durante la aplicación.


Majestad 664 SC es un herbicida formulado como suspensión concentrada que controla las malezas que se indican en los siguientes cultivos:

Cultivo	Maleza		Dosis L/ha	Observaciones
	Nombre común	Nombre científico		
Maíz, Sorgo (SL)	Acahual Coquillo rojo Ojo de perico Cola de zorra Quelite Cadillo	<i>(Simsia amplexicaulis)</i> <i>(Cyperus esculentus)</i> <i>(Melampodium divaricatum)</i> <i>(Leptochloa filiformis)</i> <i>Amaranthus hybridus)</i> <i>(Xanthium strumarium)</i>	4-6	Realizar una aplicación al suelo en pre-siembra al cultivo y preemergencia a la maleza; volumen de aplicación sugerido 200-300 L de agua/ha. Majestad 664 SC (S metolaclor + Atrazina) es un herbicida sistémico no selectivo para aplicación en pre-siembra al cultivo y preemergencia a la maleza.
	Zacate Johnson	<i>(Sorghum halepense)</i>	5-6	
Agave (0)	Quiebraplatos Quelite Flor amarilla Cerraja Zacate pinto Zacate liendrilla Zacate pata de gallo Zacate pata de gallina	<i>Ipomoea purpurea</i> <i>Amaranthus hybridus</i> <i>Melampodium divaricatum</i> <i>Sonchus oleraceus</i> <i>Echinochloa colona</i> <i>Eragrostis mexicana</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Digitaria sanguinalis</i>	4-6	Realizar una aplicación total en preemergencia a las malezas y post-emergencia al cultivo; volumen de aplicación sugerido 250-350 L de agua/ha.

(I) Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

SL: Sin Limite

Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de la última aplicación.





Contraindicaciones:

No aplicar **Majestad 664 SC** cuando el cultivo se encuentre bajo estrés. No aplicar con vientos mayores de 8 km/h para evitar la deriva del producto hacia cultivos o plantas susceptibles. No mezclar, almacenar ni aplicar este producto en tanques de acero galvanizado, excepto de acero inoxidable.

Fitotoxicidad:

Majestad 664 SC no es fitotóxico para los cultivos mencionados, siguiendo las recomendaciones específicas de la etiqueta. Es fitotóxico para todas las plantas verdes y puede dañar a las especies que no son objeto de control, por lo que se debe evitar que la aspersion caiga sobre su cultivo o cultivos aledaños.

Incompatibilidad:

No se recomienda **Majestad 664 SC** en mezcla de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos agroquímicos registrados en los cultivos recomendados en la etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

Presentaciones: 950 mL, 5 L y 10 L.