a Duwest company

Accord-T

cimoxanilo + tiofanato de metilo 800 PH

RSCO-FUNG-0301J-0369-X0282-002-80.00
Formulación: Polvo humectable

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Cimoxanilo: 1-[(EZ)-2-ciano-2-metoxiiminoacetil]-3-etilurea. (Equivalente a 80 g de i.a./Kg) **Tiofanato de metilo:** dimetil 4,4'-(o-fenilen) bis (3-tioalofanato). (Equivalente a 720 g de I.A./Kg)	8.0 72.0
INGREDIENTES INERTES: Surfactante, dispersante y diluyente	20.00
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:
Acoord-T® 80 PH es una combinación de dos ingredientes activos Cimoxanilo y Tiofanato de metilo, pertenecientes al grupo químico de los Cianocetamidas oxima y los carbamatos, respectivamente.

Modo de acción:
La mezcla de **Acoord-T® 80 PH** se compone de cimoxanilo y tiofanato de metilo, el primero tiene una excelente acción de contacto, con efecto preventivo, curativo, erradicativo, penetrante y translaminar. Su concentración permite ser aplicado a dosis bajas (alrededor de 20 veces menos que las necesarias para los fungicidas clásicos). Por otro lado, el tiofanato de metilo tiene alta capacidad de movilidad por el xilema y por el floema, posee cierta actividad de acción sobre los cloroplastos y sobre la fotosíntesis mejorando el color verde de las hojas. También se usa para la desinfección de semillas y bulbos. En las plantas se degrada a carbendazim. Su persistencia es de alrededor de 1 mes.

Espectro de uso:
Acoord-T® 80 PH puede ser aplicado en cultivos de ajo, cebolla, cebollín, espárrago, berenjena, chile, tomate verde, jitomate, papa, calabacita, calabaza, chayote, melón, pepino y sandía, para el control de diversas enfermedades como mildiú, tizón y moho gris.

COPIA CONTROLADA

Acoord-T® 80 PH es un fungicida que se utiliza para el control de las plagas y cultivos que a continuación se mencionan:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (kg/ha)	Observaciones
Ajo Cebolla Cebollín Espárrago (1)	Mildiu *(Peronospora destructor)* Mancha púrpura *(Alternaria porri)* Moho gris *(Botrytis squamosa)*	1.5-2.0	Realizar 2 aplicaciones foliares, a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 400 a 600 L de agua/Ha.
Berenjena Chile Tomate verde Jitomate Papa (1)	Tizón tardío (*Phytophthora infestans*) Tizón temprano (*Alternaria solani*) Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.5-2.0	Realizar 2 aplicaciones foliares, a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad; volumen de aplicación sugerido 550 a 600 L de agua/Ha.
Calabacita Calabaza Chayote Melón Pepino Sandía (0)	Mildiu *(Pseudoperonospora cubensis)* Tizón foliar *(Alternaria cucumerina)* Moho gris (*Botrytis cinerea*)	1.5-2.0	Realizar 2 aplicaciones foliares con intervalo de 7 días, antes del inicio de la infección en un cultivo con antecedentes de infestación; volumen de aplicación 550-650 L de agua/Ha.
() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** Sin límite. **Tiempo de reentrada a la zona tratada:** 24 horas después de su aplicación.			

Recomendaciones de uso:

Para el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección adecuado: gorra impermeable, guantes y botas de neopreno, camisa de manga larga de algodón, pantalón largo de algodón u overol de algodón, lentes de seguridad trasparente con protección hermética o careta facial protectora. Una vez concluida la jornada laboral, deberá lavar el equipo de protección con agua limpia y jabón separada de la ropa de uso común y almacenarlo junto con el equipo de trabajo bajo llave. El producto sobrante debe mantenerse en su envase original y guardarse en el lugar de trabajo bajo llave.

COPIA CONTROLADA

Método de preparación:
Durante el uso y manejo de este producto utilice el equipo de protección señalado en el apartado de la etiqueta "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO". Abra cuidadosamente el envase, rompa el sello de garantía. Antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una pre mezcla en un recipiente limpio por separado, mida la cantidad de producto recomendado en un instrumento destinado para tal fin, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Acoord-T® 80 PH** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme, utilice un trozo de madera o un instrumento destinado únicamente para este fin, nunca con las manos. Sin dejar de agitar vierta la pre mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla. Aplicar de inmediato.

Contraindicaciones:
No deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

Compatibilidad:
No debe mezclar **Acoord-T® 80 PH** con otros productos agroquímicos.

Fitotoxicidad:
Acoord-T® 80 PH no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Manejo de resistencia:
Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentaciones: 1 kg.

COPIA CONTROLADA