BalaCú
clorotalonil 720 FW

a Duwest company

RSCO-FUNG-0309-009-008-052
Formulación: Suspensión acuosa

Composición porcentual

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Clorotalonil: Tetracloroisoftalonitrilo (Equivalente a 720 g de i.a./ kg)	52.00
INGREDIENTES INERTES: Diluyente, dispersante, antiespumante, estabilizador y compuestos relacionados.	48.00
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:
Formulado a base de Clorotalonil, del grupo químico de los benzonitrilo. Contiene 720 g de ingrediente activo por kilogramo de producto.

Modo de acción:
BalaCú® 720 FW es un fungicida preventivo de contacto que trasloca localmente sobre la planta. Actúa sobre las células infecciosas de los hongos, provocando que estas pierdan su viabilidad. Su alta calidad de formulación garantiza óptimo cubrimiento y permanencia en el follaje.

Espectro de uso:
BalaCú® 720 FW posee un amplio espectro de control sobre numerosas enfermedades fúngicas en cultivos como: apio, cacahuate, calabacita, cebolla, col, coliflor, col ce Bruselas, frijol, frijol ejotero, jitomate, meón, pepino, papa, ornamentales, plátano, papayo, durazno, maíz, cacao, cafeto y soya.

COPIA CONTROLADA

a Duwest company

BalaCú® 720 FW es un fungicida preventivo de contacto. Se recomienda para su aplicación al follaje y para el control de las enfermedades en los cultivos aquí indicados:

Cultivo	Enfermedad	Dosis (L/ha)
Apio (7)	Tizón temprano *(Cercospora apii)* Tizón tardío *(Septoria apii)* Pudrición radical *(Rhizoctonia* spp*)*	1.5-1.75 1.5-3.50
Cacahuate (14)	Mancha café de la hoja *(Cercospora arachidicola)* Mancha o peca de la hoja *(Cercospora personata)* Roya *(Puccinia arachidis)*	1.5-1.75 1.75
Calabacita (SL)	Antracnosis *(Colletotrichum lagenarium)* Mildiú *(Pseudoperonospora cubensis)* Mancha o peca de la hoja *(Corynespora cubensis)* Mancha foliar *(Cercospora* spp*)* Tizón foliar *(Alternaria cucumerina)*	1.75-2.5
	Gomosis del tallo *(Mycosphaerella citrulina)* Roña *(Cladosporium cucumerinum)*	2.5-3.5
Cebolla (14)	Mancha purpura *(Alternaria porri)* Mildiú velloso *(Peronospora destructor)*	2.0-3.0
Col Coliflor Col de Bruselas (SL)	Mancha de la hoja *(Alternaria brassicae)* Mancha anular *(Mycosphaerella brassicae)* Mildiú velloso *(Peronospora parasítica)*	2.0-3.0
Frijol Frijol Ejotero (SL)	Antracnosis *(Colletotrichum lindemuthianum)* Chahuixtle *(Uromyces phaseoli)* Moho gris *(Botrytis cinerea)* Pudrición de tallo *(Sclerotinia sclerotiorum)* Tizón de la vaina y del tallo *(Diaporthe phaseolorum)*	3.0-4.0
Jitomate (SL)	Mancha gris *(Stemphylium solani)* Tizón tardío *(Phytophthora infestans)* Tizón temprano *(Altemaria solani)*	2.5-3.5
Melón Pepino (SL)	Mancha foliar *(Corynespora cassiicola)* Mildiú velloso *(Pseudoperonospora cubensis)* Roña *(Cladosporium* sp.*)* Antracnosis *(Colletotrichum lagenarium)* Cenicilla polvorienta *(Erysiphe polygoni)*	2.0-3.0

COPIA CONTROLADA

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

Papa (SL)	Mancha de la hoja *(Stemphylium solani)* Tizón tardío *(Phytophthora infestans)* Pudrición de la semilla y la raíz *(Fusarium* spp.*, Rhizoctonia* sp*)*	1.5-2.0
Ornamentales (SL)	Mancha foliar *(Mycosphaerella* sp.*)* Mancha negra *(Diplocarpon rosae)* Pudrición de la flor *(Botrytis* spp.*)*	125-200 mL/100L de agua
Plátano (7)	Sigatoka negra *(Mycosphaerella fijiensis)* Peca *(Phyllosticta musarum)* Cordana *(Cordana musae)* Sigatoka amarilla *(Mycosphaerella musicola)*	1.5-2.5 o 1.0-2.5
Papayo (14)	Tizón oral (*Alternaria* spp.) Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*) Pudrición del fruto (*Phytophthora* spp.)	2.5-4.7
Durazno (14)	Verrucosis *(Taphrina deformans)* Tiro de munición *(Coryneum beijerinckii)* Pudrición morena *(Monilinia fructicola)*	3.5-5.0
Maíz (14)	Mancha foliar *(Helminthosporium turcicum)*	2.0-3.0
Cacao (SL)	Mal de hilachas *(Corticium koleroga)* Pudrición negra *(Phytophthora palmivora)* Antracnosis *(Colletotrichum* spp*)*	200-300 mL /100L de agua
Cafeto (30)	Mancha de hierro *(Cercospora coffeicola)* Mal de hilachas (*Corticium koleroga)* Ojos de gallo *(Omphalia flavida)*	200-250 ml /100L de agua
Soya (40)	Antracnosis *(Colletotrichum dematium)* Tizón del tallo y la vaina *(Diaporthe phaseolorum)* Mancha ojo de rana *(Cercospora sojina)* Mancha púrpura *(Cercospora kikuchii)* Mancha parda *(Septoria glycine)* Mildiú *(Peronospora manshurica)*	1.5-2.5
() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** Sin Límite. **Tiempo de reentrada a la zona tratada:** 48 horas después de su aplicación.		

COPIA CONTROLADA

a Duwest company

Recomendaciones de uso:
Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:
Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **BalaCú® 720 FW** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

Compatibilidad:
No combine **BalaCú® 720 FW** en el tanque de la mezcla con plaguicidas, surfactantes y/o fertilizantes, sin que pruebas previas demuestren que la combinación es físicamente compatible, efectiva y que no provoca daño a sus cultivos, bajo las condiciones de uso locales. Las mezclas serán con productos registrados en los cultivos indicados.

Fitotoxicidad:
BalaCú® 720 FW no es fitotóxico en cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

Manejo de la resistencia:
Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación, evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentaciones:
950ml y 10L.

COPIA CONTROLADA