Coach
atrazina 500 FW

a Duwest company

RSCO-HEDE-0204-366-008-041
Formulación: Suspensión Acuosa

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Atrazina: 6-cloro-N2-etil-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 480 g i.a. /L a 20°)	**40.80**
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, humectante, antiespumante, anticongelante, espesante, diluyente, (agua) y triazinas relacionadas.	**59.20**
TOTAL:	**100.00**

Ingrediente activo:
Coach®500 FW es un herbicida formulado en suspensión acuosa con 480 gr de ingrediente activo por litro de producto. De la familia de las "triazinas", de acción sistémica y residual que, generalmente, se usa como pre-emergente aplicado al suelo luego de la siembra del cultivo. La atrazina también puede usarse como post-emergente temprano sobre malezas recientemente emergidas, aunque, en ese caso, su acción fundamentalmente es de contacto.

Modo de acción:
Coach®500 FW inhibe la transferencia de energía a través del 'Fotosistema II'. Los herbicidas de este tipo ('inhibidores PSII') se adhieren a una proteína involucrada en la cadena de transferencia, reduciendo su efectividad. Este producto en aplicaciones al suelo funciona como un "sello" puesto que el producto se activa al contacto con el agua de riego o de lluvia y absorbido por las raíces de las malezas.

Espectro de uso:
Coach®500 FW resulta efectivo en el control de numerosas malezas de hoja ancha y zacates, entre los que destacan: quelites bledo, coralillo, bolsa de pastor, cenizo blanco o quelite cenizo, tronadora o chipilín, estramonio o toloache, zacate pata de gallo, acahual, lechosa o golondrina, anisillo, estrellita o rosilla chica, malva o malvas, llantén, chilillo, verdolaga, rabanillo o rábano silvestre, zacate cola de zorra. Puede ser aplicado en el control de las malezas más comunes en cultivos de: Caña de azúcar, Sorgo y Maíz.

COPIA CONTROLADA

Coach®500 FW: es un herbicida selectivo formulado como suspensión acuosa. Es absorbido principalmente por las raíces, pero también por las hojas de las malezas. Controla a las siguientes malas hierbas de hoja ancha y zacates:

NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
HOJA ANCHA			
Cadillo Muela de caballo Zacate pinto	*Cenchrus echinatus* *Brachiaria* spp. *Echinochloa colonum*	Zacate carricillo Pelo de conejo Cola de zorra	*Panicum fasciculatum* *Poa annua* *Setaria* spp
HOJA ANGOSTA			
Quelite Quelite cenizo Verdolaga Golondrina Campanilla Acahual	*Amaranthus spp.* *Chenopodium album* *Portulaca oleracea* *Euphorbia* spp. *Ipomoea spp.* *Encelia mexicana*	Girasol Malva Sanguinaria Bolsa de pastor Acahualillo Calabacilla	*Helianthus annuus* *Malva* spp. *Polygonum aviculare* *Capsella bursa-pastoris* *Bidens pilosa* *Sicyos angulata*

CULTIVO	DOSIS L/Ha	OBSERVACIONES
Maíz y Sorgo	2 a 5 1.5 a 2 2 a 4	En pre-emergencia: aplique en los días siguientes a la siembra. Antes que emerja el cultivo. A la emergencia: si la aplicación se hace a la emergencia del maíz y sorgo después de que haya brotado la maleza, pero antes de que alcance 4cm de altura. En post-emergencia: no aplica más de 2.5 L/ha si el cultivo sucesivo sean diferente a estos.
Caña de azúcar	2 a 2.5	Aplicar inmediatamente después de la plantación o siembra.

TIEMPO DE REENTRADA A LA ZONA TRATADA: 12 horas después de la aplicación.

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guante, mascarilla, overol, etc). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

COPIA CONTROLADA

Método de preparación:
Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de vertir el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Coach®500 FW** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

Contraindicaciones:
En áreas cultivadas en las cuales existe una rotación con hortalizas o cultivos diferentes a los aquí recomendados, no deberán utilizarse dosis mayores de 3 litros/ha. No usarlo en suelos tratados con ácido húmico porque bloquea las atrazinas.

Compatibilidad:
Al mezclarse **Coach®500 FW** con otros productos autorizados en este cultivo, no se han presentado problemas de incompatibilidad. Ante la duda realice una prueba previa a la aplicación.

Fitotoxicidad:
Coach **Coach®500 FW** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

Presentaciones:
950 mL y 5 L

COPIA CONTROLADA