



a Duwest company

# Desmonte Plus

380 SA

glifosato + 2,4-D amina

RSCO-MEZC-1248-303-013-042

Formulación: Solución acuosa

## Composición porcentual:

| INGREDIENTE ACTIVO:   | % EN PESO |
|---|-----------|
| <b>Glifosato:</b> sal isopropilamina de N-(fosfono-metil) glicina.<br>Con un contenido de N-(fosfono-metil) glicina no menor de 74.01%.<br>(Equivalente a 219 g de i.a. /L a 20°C). | 25.50     |
| <b>2,4-D:</b> sal dimetilamina del ácido 2,4-Diclorofenoxiacético.<br>Con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 83%.<br>(Equivalente a 160 g de i.a. /L a 20°C).                  | 16.60     |
| <b>INGREDIENTES INERTES:</b><br>Diluyente (agua), surfactantes, estabilizante y compuestos relacionados.  | 57.90     |
| <b>TOTAL:</b>   | 100.00    |

## Ingrediente activo:

Formulado a base de Glifosato y 2,4-D en solución acuosa. Mezcla de herbicidas de los grupos fosfonoglicina y alquilclorofenoxi, con acción sistémica.

## Modo de acción:

**Desmonte Plus® 380 SA** reúne dos modos de acción distintos, los cuales le permiten controlar malezas de hoja ancha de manera rápida y eficiente, puesto que la maleza es atacada en todos los sistemas vitales, reduciendo de esta manera la resistencia a estos dos herbicidas aunado a un control excelente de malezas.

**Desmonte Plus® 380 SA** es recomendado para aplicarse en preemergencia del cultivo o en post emergencia en cultivos de hoja angosta, siempre y cuando se tengan las precauciones para evitar el contacto con el cultivo.

## Espectro de uso:

**Desmonte Plus® 380 SA** puede ser aplicado de manera dirigida para el control de las siguientes malezas:

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

[www.sifatec.com.mx](http://www.sifatec.com.mx)





a Duwest company

| CULTIVO  | NOMBRE COMÚN/NOMBRE CIENTÍFICO             | DOSIS (L/Ha) |
|--|--|--------------|
| Maíz   | Quesito ( <i>Argythamnia neomexicana</i> ) | 2.0 a 3.0    |
| Sorgo  | Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> )    |              |
| (SL)   | Zacate bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> ) |              |
| <b>(I) Intervalo de seguridad:</b> Días que deben de transcurrir en la última aplicación y la cosecha<br><b>SL:</b> Sin limite<br><b>Tiempo de reentrada en la zona tratada:</b> 12 horas después de la aplicación |  |              |

#### Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

#### Método de preparación:

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Desmonte Plus® 380 SA** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

#### Contraindicaciones:

No aplicar **Desmonte Plus® 380 SA** cerca de cultivos susceptibles y evite aplicar con vientos arriba de 8 km//h. No aplicar más de 5 L en un año.

#### Compatibilidad:

No existe incompatibilidad conocida de **Desmonte Plus® 380 SA** con otros agroquímicos hasta el momento. En caso de mezclarlo con otros productos, sólo se podrá hacer con aquellos que cuenten con registro vigente, sean compatibles y estén autorizados en el cultivo indicado.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.  
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.





a Duwest company

**Fitotoxicidad:**

**Desmorte Plus® 380 SA** puede causar fitotoxicidad a cultivos anuales si no se siguen las recomendaciones señaladas en esta etiqueta. **Desmorte Plus® 380 SA** no causa daños al asperjarlo sobre la corteza madura, pero si causará daños si se aplica sobre las partes verdes de las plantas cultivadas. Los cultivos arbóreos o arbustivos establecidos se deben de cuidar de no aplicar a la corteza inmadura del tronco o de los tallos. Evite aplicar cerca de cultivos susceptibles.

**Presentaciones:**

950 mL y 5L.

COPIA CONTROLADA

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

[www.sifatec.com.mx](http://www.sifatec.com.mx)

