Fajador

lambda - cyhalotrina **70 CE**

a Duwest company

RSCO-INAC-0177-X0191-009-7.81
Formulación: Concentrado Emulsionable

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Lambda cihalotrina: (R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3, 3,3-triuoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-a-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-triuoropropenil]-2,2 dimetilciclopropanocarboxilato. (Equivalente a 70.0 g de i.a /L a 20 °C)	7.8151
INGREDIENTES INERTES: Solvente y emulsificantes.	92.1849
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Formulado a base de Lambda-cyhalotrina que pertenece al grupo de los piretroides, el cual contiene 70 g de ingrediente activo por litro de producto.

Modo de acción:

Fajador® 70 CE actúa sobre el sistema nervioso de los insectos alterando el flujo de iones a través de la membrana nerviosa, adicionalmente interfiere en los procesos de muda, la pupación normal y la posterior formación del adulto; en conjunto, interrumpe el ciclo de desarrollo de las larvas controlando de manera simultánea los adultos.

Fajador® 70 CE se absorbe a través del exoesqueleto quitinoso de los insectos, tras lo cual estimula el sistema nervioso central, bloqueando la transmisión de los impulsos nerviosos, paralizando al insecto y muriendo este después de 120 horas por inanición.

Espectro de uso:

Fajador® 70 CE Puede usarse en cultivos aguacate, ajo, algodón, brócoli, cebolla, chile, col, maíz, papa, sorgo, soya, trigo, tomate (Jitomate).

COPIA CONTROLADA

Fajador® 70 CE es recomendado para el control de las plagas que se indican en los siguientes cultivos:

Cultivo	Nombre común/Nombre científico	Dosis L/ha	Observaciones
Algodonero (21)	Pulga saltona (*Pseudatomoscelis seriatus)*	0.5-0.7	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días, agregar a las mezcla un coadyuvante a razón de 0.05%, volumen de aplicación 950-1050 L de agua/ha
Maíz (15) Sorgo (15)	Gusano cogollero (*Spodoptera frugiperda)*	0.2-0.3	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Jitomate (5)	Gusano alfiler (*Keiferia lycopersicella)*	0.3-0.6	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Berenjena (5) Jitomate (5) Papa (10)	Gusano soldado (*Spodoptera exigua)*	0.35-0.5	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Brócoli (1) Col (1) Col de Bruselas (1) Coliflor (1)	Palomilla dorso de diamante (*Plutella xylostella)*	0.4-0.6	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 15 días.
Soya (15)	Gusano terciopelo (*Anticarsia gemmatalis)*	0.35-0.6	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 7 días.
Aguacatero (14)	Mosquita blanca (*Paraleyrodes persea)* Minador *(Gracillaria perseae)*	0.4-0.6	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días.
Tiempo de reentrada a la zona tratada: 6 horas después de su aplicación **() Intervalo de seguridad:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha			

COPIA CONTROLADA

Recomendaciones de uso:
Lea cuidadosamente las instrucciones. Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra, overol de algodón, pantalón largo, camisa de manga larga, mascarilla, lentes de seguridad, guantes y botas de neopreno. Después de una jornada de trabajo: descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como leía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

Método de preparación:
Durante el manejo, preparación de la mezcla y aplicación de **Fajador® 70 CE** siempre utilice equipo de protección personal. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe tener un pH entre 5.5-7.0 si es necesario ajustar, acondicionar una solución amortiguadora. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la premezcla en un lugar ventilado lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis recomendada de **Fajador® 70 CE** agitar y vaciar la solución de la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Para aplicaciones terrestres puede utilizarse distintos equipos dependiendo de las condiciones físicas de la parcela y estado de desarrollo del cultivo. Pueden usarse mochilas motorizadas previamente calibradas. Evite el contacto con la mezcla tanto al momento de la preparación como de la aplicación.

Contraindicaciones:
No se aplique **Fajador® 70 CE** directamente ni se permita que sus aspersiones, o vapores caigan sobre hortalizas, flores, vides, árboles frutales, plantas ornamentales, algodón y otras plantas útiles que sean susceptibles. No reingresar a las áreas tratadas hasta que hayan transcurrido seis horas después de la aplicación.

Compatibilidad:
No se recomienda mezclar **Fajador® 70 CE** con otros productos

Fitotoxicidad:
Fajador® 70 CE no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con lo recomendado en esta etiqueta.

COPIA CONTROLADA

Manejo de resistencia:
Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentaciones:
240 mL y 950 mL.

COPIA CONTROLADA