



a Duwest company

# Fundazol

tebuconazol 250 EW

RSCO-FUNG-0349-X0056-345-25.87

Formulación: Emulsión aceite en agua

## Composición Porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<b>Tebuconazole:</b> (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol (Equivalente a 250 g de i.a./L a 20°C)	25.87
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Microbiostático, espesante, humectante, dispersante, antiespumante y disolvente	74.13
<b>TOTAL:</b>	100.00

## Ingrediente activo:

Formulado a base de Tebuconazole, sistémico de la familia de los triazoles, el cual contiene 250 g de ingrediente activo por litro de producto.

## Modo de acción:

**Fundazol® 250 EW** es rápidamente absorbido a través de las hojas y la raíz con movimiento acropétalo en el interior de la planta; se transloca principalmente vía xilema, sin embargo, presentan una translocación parcial vía floema. Una vez dentro de la planta, ejercen una acción protectora más prolongada que los funguicidas residuales.

**Fundazol® 250 EW** influye sobre el proceso de biosíntesis del ergosterol en los hongos patógenos, impidiendo la formación de las paredes celulares. Como otros triazoles, impide la desmetilación del C14 del lanosterol que da lugar a la acumulación de trimetilesteroles, pero tebuconazol, además, impide la deshidrogenación con lo que también se produce una acumulación de otros esteroides.

## Espectro de uso:

Efectivo en el control de royas y cenicillas en cultivos como: avena, cebada, sorgo, trigo y vid.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

[www.sifatec.com.mx](http://www.sifatec.com.mx)





a Duwest company

**Fundazol® 250 EW** está recomendado para el control de las siguientes enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro siguiente:

CULTIVO	ENFERMEDAD NOMBRE COMÚN/NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/Ha)	OBSERVACIONES
Avena Cebada Sorgo Trigo (35)	Roya amarilla ( <i>Puccinia striiformis f. sp tritici</i> )	0.5-0.6	Se recomienda realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalos de 7 días, con un volumen de aplicación de 550 a 650 L de agua/Ha.
Vid (14)	Cenicilla ( <i>Uncinula necator</i> )	0.5-1.0	Se recomienda realizar dos aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, con un volumen de aplicación de 830 a 930 L de agua/Ha.

**( ) INTERVALO DE SEGURIDAD:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
**Tiempo de reentrada a la zona tratada:** 12 horas después de la aplicación.

#### Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

#### Método de preparación:

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Fundazol® 250 EW** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

#### Contraindicaciones:

Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, realice las aplicaciones a favor del viento (mayores a 15 km/h). No aplicar ni manejar el **Fundazol® 250 EW** sin el equipo de protección adecuado. Evite la aplicación una vez establecida la enfermedad en los cultivos. No se aplique en cultivos diferentes a los autorizados en esta etiqueta. No aplique cuando amenace lluvia, para evitar el lavado del producto.

**En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.**

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.





a Duwest company

**Compatibilidad:**

No se mezcle **Fundazol® 250 EW** con ningún otro producto agrícola.

**Fitotoxicidad:**

**Fundazol 250 EW®** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de la etiqueta.

**Manejo de la resistencia:**

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación, evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

**Presentación:**

950 mL.

COPIA CONTROLADA

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

[www.sifatec.com.mx](http://www.sifatec.com.mx)

