Nuevo

Guillotina

atrazina + sal sódica de dicamba + sal sódica de 2,4-D 490 SC

a Duwest company

REG. RSCO-MEZC-HEDE-0910J-X0044-064-43.5
Formulación: Suspensión concentrada

Composición porcentual

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Atrazina: 6-cloro-N2-etii-N4-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina (Equivalente a 240 g de i.a./L a 20°C)	**20.30**
Sal sódica de Dicamba: sal sódica del ácido 3,6-dicloro-o-anísico (Equivalente a 110 g de i.a./L a 20°C)	**10.20**
Sal sódica de 2,4-D: sal sódica del ácido (2,4-diclorofenoxi) acético (Equivalente a 140 g de i.a./L a 20°C)	**13.00**
INGREDIENTES INERTES: Surfactante, tensoactivo, anticongelante, antiespumante, humectante, espesante y diluyente	**56.50**
TOTAL:	**100.00**

Ingrediente activo:
GUILLOTINA® 490 SC es un herbicida que se compone de dos auxinas sintéticas, pertenecientes a la familia de los fenoxicarboxílicos y atrazina que pertenece al grupo de las triazinas, posee acción sistémica y residual.

Modo de acción:
GUILLOTINA® 490 SC: El 2,4 D actúa como inhibidor del crecimiento, estimula la síntesis de los ácidos nucleicos y de las proteínas, afectando la actividad de las enzimas, la respiración y la división celular. Dicamba tiene un modo de acción desconocido. Sin embargo, se cree que interfiere en el crecimiento y desarrollo celular ya que es una auxina sintética y sustituye a las auxinas. Atrazina inhibe la transferencia de energía a través del 'Fotosistema II'. Los herbicidas de este tipo se adhieren a una proteína involucrada en la cadena de transferencia, reduciendo su efectividad.

Espectro de uso:
GUILLOTINA® 490 SC está diseñado para el control post-emergente de las malezas en los cultivos de maíz y sorgo.

COPIA CONTROLADA

GUILLOTINA® 490 SC es un herbicida que se utiliza para el control de las malezas y cultivos que a continuación se mencionan:

CULTIVO	Maleza	DOSIS L/Ha	RECOMENDACIONES
Maíz, Sorgo (7)	Lechosa *(Euphorbia hirta)* Lengua de Pájaro *(Polygonum aviculare)* Malva *(Malva parviflora)* Pata de gallina *(Digitaria sanguinalís)* Tomatillo *(Physalis angulata)* Acahual *(Simsia amplexicaulis)* Cola de zorra *(Setaria viridis)* Quesillo *(Anoda crisata)*	3.0 - 4.0	Realizar 1 aplicación en post-emergencia temprana a la maleza y al cultivo, a un volumen de aplicación de 300L de agua/ha.

() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.
Tiempo de reentrada: 24 horas después de la aplicación

Recomendaciones de uso:
Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:
Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una pre mezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **GUILLOTINA®** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la pre mezcla en él tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad del tanque, sin dejar de agitar, al fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

Contraindicaciones:
GUILLOTINA® 490 SC no deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

Compatibilidad:
GUILLOTINA® no debe mezclarse con otros productos agroquímicos.

COPIA CONTROLADA

Fitotoxicidad:
GUILLOTINA® 490 SC no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

Manejo de resistencia:
Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentaciones:
950 ml.

COPIA CONTROLADA