



novaluron

Leyenda

107 CE



a Duwest company

RSCO-INAC-102V-X0206-009-9.91

Formulación: Concentrado Emulsionable

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Novaluron: (RS)-1-[3-cloro-4-(1, 1,2-trifluoro-2- trifluorometoxietoxi) fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil) urea. (Equivalente a 107 g de i.a. / L a 20°C).	9.91
INGREDIENTES INERTES: Surfactantes, co-solventes y solvente.	10.00
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Leyenda® 107 CE, este producto esta formulado a base de novaluron, que pertenece al grupo de las benzoilfenil ureas el cual contiene 107 g de ingrediente activo por kilogramo de producto.

Modo de acción:

Leyenda® 107 CE actúa inhibiendo el crecimiento sobre larvas de lepidópteros por ingestión, aunque también lo hace por contacto. **Leyenda® 107 CE** actúa inhibiendo la síntesis de la quitina produciendo una anormal deposición endocuticular y abortando la muda. Es de protección prolongada.

Espectro de uso: Insecticida recomendado para el control de larvas de lepidópteros. Puede usarse en cultivos como: Algodón, berenjena, chile, jitomate, tomate de cascara, brócoli, col, col de brúcelas, coliflor, maíz, manzano, papa.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx





a Duwest company

Leyenda® 107 CE es un insecticida formulado como concentrado emulsionable para el control de las plagas indicadas a continuación:

Cultivo	Nombre común/Nombre científico	Dosis L/ha	Observaciones
Maíz Sorgo Avena Cebada Trigo (30)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.20-0.25	Se recomienda realizar dos aplicaciones dirigidas al follaje a intervalos de 8 días; volumen de aplicación 430-530 L de agua/Ha.
Papa Chile Berenjena Jitomate Tomate de cáscara (15)	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.20-0.25	Se recomienda realizar dos aplicaciones dirigidas al follaje a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 370-470 L de agua/Ha.
Brócoli Col Col de bruselas Coliflor (14)	Palomilla dorso de diamante (<i>Plutella xylostella</i>)	300-400	Se recomienda realizar dos aplicaciones dirigidas al follaje a intervalos de 7 días, iniciando cuando se detecten las primeras larvas sobre el cultivo, con un volumen de aplicación 400-500 L de agua/Ha.
Aguacate (7)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	150 mL/ 100 L de agua	Se recomienda realizar una aplicación al follaje.
() Intervalo de seguridad Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de su aplicación.			

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.





a Duwest company

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:

Durante el manejo, preparación de la mezcla y la aplicación de **Leyenda® 107 CE** siempre utilice equipo de protección personal indicado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de esta etiqueta. Para abrir el producto gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj. El agua a utilizar para la aplicación debe estar libre de sedimentos y tener un pH entre 5.5-7.0, si es necesario ajustar, adicionar una solución amortiguadora. Colocar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de mezclado y en un recipiente aparte preparar la premezcla en un lugar ventilado, lejos de fuentes de agua y solo la cantidad de mezcla a utilizar. Para medir la cantidad exacta del producto, utilice un equipo graduado. Agregar la dosis recomendada de **Leyenda® 107 CE**. Agitar y vaciar la solución de la premezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar a fin de homogeneizar la solución de la mezcla. Para aplicaciones terrestres puede utilizarse distintos equipos dependiendo de las condiciones físicas de la parcela y estado de desarrollo del cultivo. Se recomienda utilizar una mochila motorizada, previamente calibrada a fin de obtener un volumen de agua suficiente para obtener una buena cobertura. Evite el contacto con la mezcla tanto al momento de la preparación como de la aplicación.

Contraindicaciones:

No aplique **Leyenda® 107 CE** en horas de calor intenso. No aplique **Leyenda® 107 CE** cuando amenace lluvia o este lloviendo, a fin de evitar el lavado del producto. No aplique **Leyenda® 107 CE** cuando la velocidad del viento sea alta (>15 km/h), a fin de evitar deriva del producto.

Compatibilidad:

No mezclar **Leyenda® 107 CE** con otros productos. Sin embargo, si se desea mezclar, se recomienda que la mezcla se realice con productos registrados ante la Autoridad competente para el cultivo recomendado en la etiqueta, haciendo pruebas preliminares de compatibilidad física y fitotoxicidad, previas a la aplicación.

Fitotoxicidad:

Leyenda® 107 CE no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.





a Duwest company

Manejo de resistencia:

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentaciones:

240 mL y 950mL.

COPIA CONTROLADA

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx

