



a Duwest company

# Monocrotofos



monocrotofos

600 LS

RSCO-INAC-0149-328-052-056

Formulación: Líquido soluble

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<b>Monocrotofos:</b> Dimetil-(E)-1-metil-2 (metilcarbamoil) vinil fosfato (Equivalente a 600 g de i.a/L a 20°C).	56.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Solventes.	44.00
<b>TOTAL:</b>	100.00

#### Ingrediente activo:

Formulado a base de Monocrotofos, del grupo de los organofosforados, el cual contiene 600 g de ingrediente activo por litro de producto.

#### Modo de acción:

**MONOCROTOFOS® 600 LS** es de carácter sistémico que actúa por ingestión y por contacto, debido a su acción sistémica penetra a los tejidos de la planta, en cantidades letales para eliminar insectos que no han sido aplicados directamente por el producto. Afecta al sistema nervioso, inhibiendo la acetilcolinesterasa. **MONOCROTOFOS® 600 LS** tiene una actividad sobresaliente para el control de gusanos y picudos.

#### Espectro de uso:

De amplio espectro, efectivo para el control de chicharritas, chinches, escamas, minadores, de las hojas, mosquitas blancas, pulgas saltonas, pulgones, algunos trips y algunos ácaros en cultivos como: Alfalfa, algodón, apio, coliflor, brócoli, chícharo, chile, espinaca, frijol, jitomate, lechuga, limonero, maíz, sorgo, manzana, naranja, toronjo, tangerino, melón nogal, ornamentales, papa, soya, tabaco, trigo y vid.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

[www.sifatec.com.mx](http://www.sifatec.com.mx)





a Duwest company

**MONOCROTOFOS® 600 LS** es recomendado para el control de las plagas en los cultivos aquí indicados:

CULTIVO	PLAGA (NOMBRE COMÚN/NOMBRE CIENTÍFICO)	DOSIS (L/Ha)
Algodonero (21)	Araña roja ( <i>Tetranychus</i> spp.) Chinche apestosa café ( <i>Euschistus sevus</i> ) Chinche ligus ( <i>Lygus</i> spp.) Chinches manchadora ( <i>Dysdercus</i> spp.) Chinche rápida ( <i>Creontiades</i> spp.) Chinche verde ( <i>Nezara viridula</i> ) Gusano bellotero ( <i>Heliothis zea</i> ) ( <i>Heliothis virescens</i> ) Gusano falso medidor de la col ( <i>Trichoplusia ni</i> ) Gusano peludo ( <i>Estigmene acrea</i> ) Gusano rosado ( <i>Pectinophora gossypiella</i> ) Gusano soldado ( <i>Spodoptera exigua</i> ) Medidor de la hoja del algodón ( <i>Alabama argillacea</i> ) Mosquita blanca ( <i>Bemisia tabaci</i> ) Picudo del algodón ( <i>Anthonomus grandis</i> ) Pulga saltona del algodón ( <i>Pseudatomoscelis seriatus</i> ) Pulga del algodón y melón ( <i>Aphis gossypii</i> )	0.5-1.5
Papa (7)	Pulgón de la papa ( <i>Macrosiphum solanifolii</i> ) Gusano falso medidor de la col ( <i>Trichoplusia ni</i> ) Gusano soldado ( <i>Spodoptera exigua</i> ) Mosquita blanca de los invernaderos ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ) Palomilla de la papa ( <i>Phthorimaea operculella</i> ) Pulga saltona negra ( <i>Epitrix</i> spp.) Pulgón ( <i>Macrosiphum</i> spp.)	0.5 - 1.0
Soya (30)	Catarina o mayate ( <i>Diabrotica balteata</i> ) Chinche lygus ( <i>Lygus</i> spp.) Chinche verde ( <i>Nezara viridula</i> ) Falso medidor de la soya ( <i>Pseudoplusia includens</i> ) Gusano peludo ( <i>Estigmene acrea</i> ) Gusano soldado ( <i>Spodoptera exigua</i> ) Gusano terciopelo ( <i>Anticarsia gemmatalis</i> ) Trips negro ( <i>Caliothrips phaseoli</i> ) Gusano de la vaina ( <i>Heliothis zea</i> )	1.0

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.  
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.



a Duwest company

Tabaco (5)	Gusano de la yema del tabaco ( <i>Heliothis virescens</i> ) Gusano falso medidor de la col ( <i>Trichoplusia ni</i> ) Gusano peludo ( <i>Estigmene acrea</i> ) Gusano soldado ( <i>Spodoptera exigua</i> ) Mosquita blanca ( <i>Trialeurodes</i> spp.) Picudo ( <i>Trichobaris championi</i> ) Pulga saltona del tabaco ( <i>Epitrix hirtipennis</i> )	1.0-1.5
Caña de azúcar (30)	Barrenador del tallo ( <i>Chilo</i> spp.) Barrenador grande del maíz ( <i>Diatraea grandiosella</i> ) Barrenador occidental ( <i>Diatraea considerata</i> ) Chinche de encaje de la caña de azúcar ( <i>Leptodictya tabida</i> ) Mosca pinta ( <i>Aeneolamia postica</i> ) Mosca pinta o salivazo ( <i>Prosapia simulans</i> ) Pulgón amarillo de la caña de azúcar ( <i>Sipha flava</i> )	1.0-1.5
Cacahuete (21)	Diabrotica o doradilla ( <i>Diabrotica</i> spp.) Gusano falso medidor de la col ( <i>Trichoplusia ni</i> ) Gusano soldado ( <i>Spodoptera exigua</i> )	1.0-1.5
Jitomate Tomate de cáscara (21)	Chicharrita ( <i>Empoasca</i> spp.) Gusano del cuerno del jitomate ( <i>Manduca quinquemaculata</i> ) Gusano del fruto ( <i>Heliothis zea</i> ) Gusano falso medidor de la col ( <i>Trichoplusia ni</i> ) Mosquita blanca de los invernaderos ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> ) Pulga saltona negra ( <i>Epitrix</i> spp.) Pulgón mizus ( <i>Myzus persicae</i> ) Trips de las flores ( <i>Frankiniella tritici</i> ) Gusano soldado ( <i>Spodoptera exigua</i> )	0.5-1.5

**(I) Intervalo de seguridad:** Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.  
**Tiempo de reentrada a la zona tratada:** 72 horas después de su aplicación.

#### Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y la aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (ropa protectora, lentes, mascarilla, overol, gorra, botas y guantes). El producto sobrante debe conservarse en su envase original, manteniéndolo cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

**En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.**  
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.





a Duwest company

#### **Método de preparación:**

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla, en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **MONOCROTOFOS® 600 LS** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una mezcla uniforme. Sin dejar de agitar vierta la premezcla, en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogeneizar la mezcla y aplicar de inmediato.

#### **Contraindicaciones:**

No aplique **MONOCROTOFOS® 600 LS** en las horas de calor intenso, ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 km/h). Se recomienda hacer las aplicaciones en las primeras horas de la mañana. No pastorear ganado en áreas tratadas. No tocar las áreas durante los dos días después de la aplicación.

#### **Fitotoxicidad:**

**MONOCROTOFOS® 600 LS** no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo a las especificaciones de esta etiqueta.

#### **Manejo de resistencia:**

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

**Presentaciones:** 950 mL.

**En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.**

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

[www.sifatec.com.mx](http://www.sifatec.com.mx)

