



a Duwest company



Mohicano

imidacloprid + lambda cihalotrina 300 SC

REG: RSCO-MEZC-INAC-0199-0177-X0073-064-26.5

Formulación: Suspensión concentrada

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamina (Equivalente a 200.00 g de i.a./L a 20 °C)	17.7
Lambda cihalotrina: (R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S) -a-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 100.00 g de i.a./L a 20 °C)	8.8
INGREDIENTES INERTES: Disolventes, tensoactivo, surfactantes, espesante, anticongelante y antiespumante	73.50
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo

Mohicano® 300 SC, es una mezcla de insecticidas formulado a base de Imidacloprid y Lambda cihalotrina pertenecientes al grupo de los neonicotinoides y los piretroides, respectivamente.

Modo de acción

La mezcla de los ingredientes activos que conforman **Mohicano® 300 SC** actúan de manera sinérgica. Imidacloprid interfiere en la transmisión de estímulos en el sistema nervioso central del insecto, mientras Lambda cihalotrina, al actuar por contacto e ingestión, bloquea los canales de sodio, lo que aumenta el efecto de derribo en los insectos y deja una alta residualidad en la zona aplicada.

Espectro de uso

Es un insecticida indicado para el control de insectos chupadores como mosquita blanca y trips en el cultivo de aguacate.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx





a Duwest company

Mohicano® 300 SC, se aplica diluido en agua en forma de aspersión directamente al follaje en los cultivos que aquí se indican:

CULTIVO	PLAGAS NOMBRE COMÚN/NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (mL/ha)	OBSERVACIONES
Aguacatero (15)	Mosquita blanca (<i>Paraleyrodes perseae</i>) Trips (<i>Scirtothrips perseae</i>)	0.2-0.25	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al inicio de la floración, iniciar las aplicaciones cuando se detecten las primeras poblaciones plaga en el cultivo; volumen de aplicación 950-1050 L/ha.
() Intervalo de seguridad: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Tiempo de reentrada a zonas tratadas: 12 horas después de la última aplicación.			

Recomendaciones de uso

Durante el uso y manejo de este producto, use equipo de protección personal adecuado incluyendo camisa de manga larga y pantalón largo, overol, lentes de seguridad química, mascarilla equipada con cartuchos contra vapores orgánicos, guantes y botas de neopreno. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal, lávelo con agua limpia y jabón. Realizar la mezcla del producto en un lugar ventilado. Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa.

Método de preparación

Durante el uso y manejo de este producto utilizar el equipo de protección señalado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" (gorra impermeable, camisa de manga larga y overol de algodón, googles o lentes de seguridad para químicos con protección hermética, mascarilla con filtro contra gases y vapores, guantes y botas de neopreno). Con el equipo de seguridad puesto antes de usar el producto, agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y mida el producto a utilizar con una probeta, antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una pre mezcla en un recipiente limpio por separado, agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **Mohicano® 300 SC** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar vierta la pre mezcla en el tanque de mezclado. Agregue agua (libre de sedimentos) hasta la totalidad de la capacidad del tanque, sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato. Efectúe el triple lavado del envase vacío y vierta el agua del lavado al tanque de la mezcla. Perfore el envase vacío y deposítelo en un Centro de Acopio Autorizado.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.





a Duwest company

Contraindicaciones

No deberá ser aplicado durante horas de calor intenso, cuando el viento sea fuerte (15 km/h), ni cuando exista alta probabilidad de lluvia o este lloviendo, ya que puede haber un lavado del producto. Preferentemente realizar la aplicación a favor del viento en las primeras horas de la mañana o por las tardes.

Incompatibilidad

No debe mezclar **Mohicano® 300 SC** con otros productos plaguicidas.

Fitotoxicidad

Mohicano® 300 SC, no es fitotóxico a los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

Manejo de la resistencia:

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentaciones:

240 mL y 950 mL

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx

