Sifatec®

NovaBacter 100

estreptomicina + oxitetraciclina

a Duwest company

RSCO-MEZC-1305-001-003-020
Formulación: Polvo soluble

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Estreptomicina: Sulfato de estreptomicina. (Equivalente a 150 g de i.a./kg.)	18.795
Oxitetraciclina: Clorhidrato de oxitetraciclina "Con un contenido de oxitetraciclina base no menor del 75%". (Equivalente a 15 g de i.a./kg).	1.618
INGREDIENTES INERTES: Diluyente y humectante	79.58
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:
Formulado a base de oxitetraciclina + estreptomicina en polvo soluble. Bactericida del grupo de los antibióticos con acción sistémica.

Modo de acción:
NovaBacter 100® es un antibiótico de amplio espectro (estrectomicina + oxitetraciclina), que ejerce su acción en la inhibición de la síntesis proteica, impidiendo la relación codon-anticodon, bajo la dirección del ARNm. El antibiótico penetra en el interior de la planta a través de las hojas, en concreto, a través de las estomas, trastocándose rápidamente al resto del tejido; a la célula accede por difusión pasiva y transporte activo.

Espectro de uso:
NovaBacter 100® resulta efectivo en el control de tizón de fuego en el cultivo de peral.

COPIA CONTROLADA

NovaBacter 100® está recomendado para utilizarse en el siguiente cultivo:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Peral (30)	TIZON DE FUEGO *(Erwinia amylovora)*	600 g/100 L de agua.

Recomendaciones de uso:
Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:
Abra cuidadosamente el sobre. Colóquese de espalda al viento, vierta y agite suavemente el contenido utilizando para ello un removedor y nunca las manos. En una cubeta de agua mezcle **NovaBacter 100®** necesario para la aplicación y agítese hasta producir una mezcla uniforme. Agregar esta suspensión lentamente y agitándola al tanque de aplicación y/o tambo que contenga agua hasta la mitad y posteriormente llene con agua necesaria para obtener una mezcla uniforme sin grumos y aplicar de inmediato. En cada ocasión que cargue la aspersora deberá agitar la mezcla del tambo. **NovaBacter 100®** puede ser aplicado con cualquier equipo aspersor siempre y cuando facilite la cobertura uniforme de las superficies tratadas.

Contraindicaciones:
NovaBacter 100® contiene antibióticos no estériles, por lo que deberá evitar su uso en medicina veterinaria, humana o cualquier otro uso diferente al agrícola.

Compatibilidad:
NovaBacter 100® no debe ser mezclado con productos de fuerte reacción alcalina como caldo bordelés. La mezcla con otros productos deberá hacerse con aquellos que se encuentren registrados y autorizados ante la autoridad competente.

Fitotoxicidad:
NovaBacter 100® no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

COPIA CONTROLADA

Manejo de resistencia:
Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentación:
300 g y 1 kg.

COPIA CONTROLADA