NovaBacter 500

estreptomicina + oxitetraciclina + oxicloruro de cobre

a Duwest company

RSCO-MEZC-1306-302-002-081
Formulación: Polvo humectable

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Estreptomicina: Sulfato de estreptomicina (Equivalente a 17.6 g de i.a./kg.)	2.205
Oxitetraciclina: Clorhidrato de oxitetraciclina "Con un contenido de oxitetraciclina base no menor del 75%" Equivalente a 1.75 g de i.a./kg.	0.189
Oxicloruro de Cobre: Oxicloruro de cobre "con un contenido de cobre metálico como elemento no menor del 59%". (Equivalente a 424 g de i.a./kg.)	78.489
INGREDIENTES INERTES: Diluyente y humectante	19.117
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:
Formulado a base de oxitetraciclina + estreptomicina + oxicloruro de cobre en polvo humectable. Bactericida del grupo de los antibióticos más cobre, con acción sistémica.

Modo de acción:
NovaBacter 500® posee la ventaja de contener cobre en su formulación, este actúa como un protector de contacto, su aplicación forma una lámina superficial de protección que evita que las bacterias se establezcan y se desarrollen.

Espectro de uso:
NovaBacter 500® resulta efectivo en el control de tizón de fuego en el cultivo de peral.

NovaBacter 500® está recomendado para utilizarse en el siguiente cultivo:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Peral (30)	TIZON DE FUEGO *(Erwinia amylovora)*	600 g/100 L de agua.

COPIA CONTROLADA

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

Recomendaciones de uso:
Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:
Abra cuidadosamente el sobre. Colóquese de espalda al viento, vierta y agite suavemente el contenido utilizando para ello un removedor y nunca las manos. En una cubeta de agua mezcle la cantidad de **NovaBacter 500®** necesaria para la aplicación y agítese hasta producir una mezcla uniforme. Agregar esta suspensión lentamente y agitándola al tanque de aplicación y/o tambo que contenga agua hasta la mitad y posteriormente llene con agua necesaria para obtener una mezcla uniforme sin grumos y aplicar de inmediato. En cada ocasión que cargue la aspersora deberá agitar la mezcla del tambo. **NovaBacter 500®** puede ser aplicado con cualquier equipo aspersor siempre y cuando facilite la cobertura uniforme de las superficies tratadas.

Contraindicaciones:
NovaBacter 500® contiene antibióticos no estériles, por lo que deberá evitar su uso en medicina veterinaria, humana o cualquier otro uso diferente al agrícola.

Compatibilidad:
NovaBacter 500® no debe ser mezclado con productos de fuerte reacción alcalina como caldo bordelés. La mezcla con otros productos deberá hacerse con aquellos que se encuentren registrados y autorizados ante la autoridad competente.

Fitotoxicidad:
NovaBacter 500® no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta.

Manejo de resistencia:
Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentación:
1 kg

COPIA CONTROLADA