a Duwest company

Sifacarb

82% PS

bicarbonato de potasio

RSCO-FUNG-0302I-303-003-082
Formulación: Polvo soluble

Composición porcentual

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Bicarbonato de potasio (Equivalente a 820 g de i.a./kg)	82.00
INGREDIENTES INERTES: Dispersante, humectante y diluyente.	18.00
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:
Formulado a base de Bicarbonato de potasio, pertenece al grupo químico de compuestos orgánicos de potasio, el cual contiene 820 g de ingrediente activo por kilogramo de producto.

Modo de acción:
Sifacarb® 82 PS actúa de manera preventiva adhiriéndose a la parte superficial del vegetal, desde donde ejerce su acción fungicida; cuando entra en contacto con el micelio del hongo le produce la ruptura de la pared celular, la cual es esencial para las funciones vitales de los hongos.

Espectro de uso:
Es de amplio espectro de control para enfermedades fungosas en cultivos como: cebolla, calabacita, calabaza, chayote, chile, jitomate, frutillas, melón, pepino, tomate de cáscara, papa, rosal y sandía. Este producto puede utilizarse para agricultura orgánica debido a su baja toxicidad.

COPIA CONTROLADA

Sifacarb® 82 PS está recomendado para el control de las siguientes enfermedades en los cultivos indicados en el cuadro siguiente:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/ha)	USO
Rosal (SL)	Cenicilla Polvorienta *(Sphaerotheca pannosa)*	100-200 g/100L de agua	Realizar tres aplicaciones al follaje en intervalos de 5 días, cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.
Calabacita Calabaza Melón Pepino Sandía Chayote (SL)	Cenicilla de las Cucurbitáceas *(Erysiphe cichoracearum)* Moho Gris *(Botrytis cinerea)*	3.0 a 5.0	Realizar tres aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua / ha.
Cebolla Poro Ajo Cebollín Espárrago (SL)	Mildiú *(Peronospora destructor)* Moho Gris *(Botrytis squamosa)*	2.0 a 4.0	Realizar cuatro aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 350-450 L de agua / ha.
Jitomate Berenjena Tomate de Cáscara Chile Papa (SL)	Tizón Tardío *(Phytophtora infestans)* Tizón Temprano *(Alternaria solani)*	2.0 a 4.0	Realizar cuatro aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua / ha.
Arándano Frambuesa Grosella Zarzamora (SL)	Moho gris *(Botrytis cinerea)* Mildiú *(Peronospora rubí)*	2.0 a 4.0	Realizar cuatro aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días; volumen de aplicación 550-650 L de agua / ha.
() Intervalo de seguridad: Días que deberán transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **SL:** Sin Límite. **Tiempo de reentrada a la zona tratada:** 4 horas después de su aplicación.			

COPIA CONTROLADA

Recomendaciones de uso:
Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (ropa protectora, lentes, mascarilla, overol, gorra, botas y guantes.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

Método de preparación:
Abra cuidadosamente la bolsa. Colóquese de espalda al viento y vierta la cantidad de **Sifacarb® 82 PS** necesario para la aplicación en una cubeta con agua, agite suavemente hasta obtener una mezcla uniforme utilizado para ello un removedor y nunca las manos. Agregar esta mezcla, lentamente y agitándola en el tanque de aplicación y/o tambo que contenga agua hasta la mitad y posteriormente llene con agua necesaria para obtener una mezcla uniforme sin grumos y aplicar de inmediato. Cada vez que cargue el equipo de aplicación deberá agitar la mezcla.

Contraindicaciones:
No aplicar **Sifacarb® 82 PS** en horas de calor intenso, ni cuando existan vientos mayores de 15 km/h. No aplique cuando amenace la lluvia o está lloviendo.

Compatibilidad:
Sifacarb® 82 PS no debe mezclarse con otros productos.

Fitotoxicidad:
Sifacarb® 82 PS no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si se aplica de acuerdo con las especificaciones de esta etiqueta. No exceda las dosis indicadas en el cuadro de recomendaciones de uso ya que se podría presentar una ligera necrosis.

Manejo de la resistencia:
Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación, evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentaciones:
1 kg.

COPIA CONTROLADA