



a Duwest company

Uzzi 101

picloram + 2,4-D **304 SCA**

RSCO-MEZC-HEDE-1260-X0002-014-48.7
Formulación: Solución concentrada acuosa

Composición porcentual:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Picloram: Sal triisopropanolamina del ácido 4, amino 3, 5, 6-tricloropicolinico. (Con un contenido de Picloram ácido no menor de 55.82 %). (Equivalente a 64 g de i.a./L a 20 °C)	10.00
2, 4-D: Sal triisopropanolamina del ácido 2, 4-Diclorofenoxiacético (con un contenido de ácido 2, 4-D no menor de 53.61 %). (Equivalente a 240 g de i.a./L a 20 °C)	38.70
INGREDIENTES INERTES: Diluyente y surfactante.	51.30
TOTAL:	100.00

Ingrediente activo:

Formulado a base de picloram y 2, 4-D en solución concentrada acuosa. Mezcla de herbicidas de los grupos ácido picolínico y alquilclorofenoxi, con acción sistémica.

Modo de acción:

UZZI 101® 304 SCA es un herbicida post-emergente sistémico de acción hormonal; aplicado al follaje de las malezas de hoja ancha, herbáceas y leñosas en activo crecimiento, penetra por las hojas y partes verdes jóvenes; es movilizado por toda la planta en forma acropétala y basipétala.

Espectro de uso:

Espectro de control en post-emergencia temprana, cuando la maleza se encuentra en crecimiento activo, especialmente para malezas dicotiledóneas herbáceas y arbustivas presentes en potreros.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.
Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

www.sifatec.com.mx





a Duwest company

Malezas que se controlan con **UZZI 101® 304 SCA:**

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/ha)
Pastizales establecidos en potreros (SL)	Chukum, Humo Pica-pica Platanillo bijaua Huizache o Subinche Escobilla o Chichibé Ikaban Golondrina Correhuela Malva Mala mujer Zarza Candelillo Canlol Quiebra platos Huisachillo Mezquite Berenjena Dormilona Pata de vaca Quiebra platos Agritos, Trébol Chicalote	<i>Phithecellobium</i> spp. <i>Mucuna pruriens</i> <i>Heliconia bihai</i> <i>Acacia farnesiana</i> <i>Sida acuta</i> <i>Croton</i> spp. <i>Euphorbia</i> spp. <i>Convolvulus arvensis</i> <i>Malva</i> spp. <i>Cnidoscolus urens</i> <i>Mimosa pigra</i> <i>Tecoma stans</i> <i>Crotalaria sagittalis</i> <i>Acacia tortuosa</i> <i>Prosopis juliflora</i> <i>Solanum</i> spp. <i>Mimosa pudica</i> <i>Bauhinia</i> spp. <i>Ipomoea purpurea</i> <i>Oxalis corniculata</i> <i>Argemone mexicana</i>	3.0 -5.0
Pastizales establecidos en potreros (SL)	Abrojo Cornezuelo	<i>Koeberlinia spinosa</i> <i>Acacia cornígera</i>	4.0 -5.0
OBSERVACIONES: Aplicar una sola vez en post-emergencia temprana al pasto y a la maleza, cuando estas se encuentran en crecimiento activo. () Intervalo de seguridad: Días entre la última aplicación y la cosecha. SL: Sin límite. Tiempo de reentrada a la zona tratada: 24 horas después de la aplicación.			

Recomendaciones de uso:

Durante el manejo y aplicación de este producto use el equipo de protección adecuado (guantes, mascarillas, overol, etc.). El producto sobrante debe conservarse en su envase original y mantenerse cerrado en un lugar fresco, seco y ventilado.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.





a Duwest company

Método de preparación:

Antes de usar el producto agite el envase. Abra cuidadosamente el envase rompiendo el sello de garantía y antes de verter el producto al equipo de aplicación, realice una premezcla en un recipiente limpio por separado agregue agua hasta un tercio de su capacidad, incorpore lentamente la cantidad de **UZZI 101® 304 SCA** a utilizar, agitando continuamente hasta obtener una solución uniforme. Sin dejar de agitar, a fin de homogenizar la mezcla y aplicar de inmediato.

Contraindicaciones:

No aplique **UZZI 101® 304 SCA** directamente, ni se permita que entre en contacto con hortalizas, flores, vid, árboles frutales, plantas ornamentales, algodón, oleaginosas, frijol o algunas otras plantas deseables que sean susceptibles al 2, 4-D y Picloram. No se use en céspedes de gramíneas con estolones como pastos bent, a menos de que se aplique un tratamiento dirigido en manchones; tampoco se use en céspedes o pastizales recién sembrados, sino hasta que las gramíneas se encuentren establecidas alrededor de 45 días después de la siembra.

Compatibilidad:

No deberá mezclarse **UZZI 101® 304 SCA** con otros productos.

Fitotoxicidad:

UZZI 101® 304 SCA es fitotóxico para todos los vegetales de hoja ancha, por lo tanto, deberá aplicarse, respetando las indicaciones de uso recomendadas en la etiqueta.

Manejo de resistencia:

Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes, siempre respete las dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de detoxificación y mediante el apoyo de otros métodos de control.

Presentación:

950 ml, 5 L, 10 L y 20 L.

En caso de dudas sobre su aplicación y efectos, hacer pruebas de campo antes de usarse.

Sifatec garantiza su composición y su uso conforme a la etiqueta.

